



Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes u otros similares.

Debe estar claramente señalado con un cartel que indique "Cuidado-Veneno" (calavera)

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: AKITO es un insecticida

contacto, ingestión e inhalación, contra diversas plagas en diferentes cultivos. Su principio activo "Beta cipermetrina" esta compuesto por 2 isómeros lo que le confiere mayor actividad.

Cultivo	Plaga		Concentración en 100 lts	Dosis/ha
	Nombre Común	Nombre Científico		
Trigo	Lagarta cogollera	Spodoptera frugiperda		100-150 cc/ha
Soja	Lagarta de las leguminosidades	Anticarsa gemmatilis		50-75 cc/ha
	Chiche verde	Nezara viridula		300-350 cc/ha
Tomate	Polilla de tomate	Tuta absoluta	50-60 cc/100 lts de agua	100-120 cc/ha

APLICAR FUERA DEL PERIODO DE FLORACION DEL CULTIVO Y EN AUSENCIA DE MALEZAS EN FLOR DENTRO Y EN EL AREA CIRCUNDANTE DEL CULTIVO

Momento de aplicación: Aplicar cuando aparezca la plaga

Número, frecuencia ó espaciamiento de aplicaciones si corresponde: En condiciones normales una sola aplicación sería necesaria para controlar la población de la plaga.

Compatibilidad y fitotoxicidad: Con la mayoría de los plaguicidas de uso común que sean de reacción ácida. No mezclar con productos de reacción alcalina.

En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo. En caso de realizar mezclas, diluir los componentes de la misma por separado arrojándolos al tanque de la máquina con los agitadores en marcha.

Tiempo de espera: Maíz y Soja: 14 días; Tomate: 3 días.

Tiempo de reintegro al cultivo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado, dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

Modo de aplicación: Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad y luego con los agitadores en marcha agregar la cantidad necesaria de AKITO y completar el llenado de agua. Debe haber un mojado homogéneo en toda la superficie a tratar. Los lts/ha del caldo son estimativos dependiendo del tamaño del área a tratar y la superficie a tratar.

Método de aplicación: Con equipos terrestres o aéreos.

No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana centros poblados y del límite del predio de centros educativos.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y del límite del predio de centros educativos.

No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares)
No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales
No efectuar el llenado de la maquinaria de aplicación con agua directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios



NOCIVO



NEGRO AMARILLO

