

AZUFRUT 80 WDG

FUNGICIDA - ACARICIDA

GRANULADO DISPERSABLE

Principio Activo	Porcentaje en peso	Contenido en volumen (ISO)
AZUFRE	80 %	■

GRUPO QUÍMICO A QUE PERTENECE EL
INGREDIENTE ACTIVO: INORGANICO



FIRMA REGISTRANTE:

SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY
Brigadier General Fructuoso Rivera (Ruta 5) N° 7451 esq. Atuna, Montevideo
Tels: 2508 6322 - 2508 8866
Fax: 2508 6550 - E-mail: saudu@saudu.com.uy
Web: www.saudu.com.uy

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Clasificación Toxicológica Aguda: CLASE III (Tres) LIGERAMENTE PELIGROSO, IPCS/QMS, 2019

Antídotos: No tiene antídoto.

Primeros auxilios: En caso de ingestión: NO provocar el vómito.

En caso de contacto con los ojos: lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT APORTANDO NOMBRE COMERCIAL O NUMERO DE REGISTRO, TELÉFONO 1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

Otras Advertencias: C8 - Provoca irritación cutánea

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados que hayan tenido contacto con el producto. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes de nitrilo, botas, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y polinizadores, lombrices:

A) **Medidas Generales:** No producir deriva. No lavar ni vaciar equipos de aplicación en lagos, ríos, otras fuentes de agua o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagües naturales. En caso de derrame durante la aplicación, contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. Llamar a DINACEA, teléfono 29006136 int. 4600. La protección de los

USO AGRÍCOLA
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO
ADJUNTO, SI EXISTE) ANTES DE USAR EL
PRODUCTO

Grupo FRAC	M02	Agilidad FUNGICIDA
Grupo IRAC	UN	Agilidad ACARICIDA

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL
MCAP.
REGISTRO N° 1415

N° DE LOTE:
FECHAS DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO:
TIEMPO DE VALIDEZ: 2 AÑOS
FECHA DE VENCIMIENTO:
NOMBRE DEL FABRICANTE: QUIMETAL INDUSTRIAL S.A.
PAÍS DE ORIGEN: CHILE

B) Peligrosidad del ingrediente activo/formulado. TOXICIDAD PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS: MUY ALTAMENTE TÓXICO. A las dosis recomendadas presenta riesgo en organismos acuáticos, luego de aplicar medidas de refinamiento.

Medidas de mitigación: Prohibido aplicar el producto en condiciones climáticas que favorezcan la escorrentía (pronósticos de lluvia dentro de las 24 horas de aplicación) o la deriva del producto. No aplicar el producto en surcos de erosión, desagües o áreas que favorezcan el escurrimiento a cuerpos de agua adyacentes. No aplicar dentro del área de la zona BUFFER (10 metros para aplicaciones terrestres y 30 metros para aplicaciones aéreas).

TOXICIDAD PARA AVES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO.

TOXICIDAD PARA POLINIZADORES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. TOXICIDAD PARA ORGANISMOS DE SUELO (Lombrices): PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO.

A) Destino Ambiental: Solubilidad en agua: baja. Movilidad en suelo: baja. Coeficiente de partición octanol/agua: s/d. Persistencia en suelo: ligera. Persistencia en agua: estable. Potencial de Lixiviación: bajo. Potencial de volatilización: bajo.

Instrucciones de almacenamiento: guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas raciones, fertilizantes u otros similares



MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELÉF: 1722 CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS,

NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA,
PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA

Compatibilidad y fitotoxicidad:

No mezclar con productos alcalinos o aceites. Suspender los tratamientos con temperaturas superiores a 28° C o inferiores a 4° C. Dejar transcurrir un plazo de 28 días entre una aplicación de azufre y otra de aceite. No pulverizar en épocas que los frutos toman color (manzanas y uvas). Las variedades de manzana y para sensibles al azufre tratarlas sólo en prefloración. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico-químico o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo en una botella limpia. Hecha la mezcla a escala, se agita y posteriormente se deja en reposo y se analiza a 1, 5, 10 y 30 minutos. Si luego de 1 minuto, la mezcla se corta, no deberá aplicarse. Si el corte está entre los 5 y 10 minutos, con agitación se puede aplicar. Si a los 30 minutos, no se corta, se considera que la mezcla es estable.

Tempos de espera: No corresponde por no tener LMR requeridos. **Tiempo de reingreso al cultivo:** No ingresar al cultivo hasta que haya secado el depósito del producto aplicado, dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

PREVENCIÓN DE RESISTENCIA: Cuando fungicidas de un mismo modo de acción, son usados repetidamente en las mismas zonas o sobre el mismo cultivo, puede producirse la aparición de biotipos resistentes, que logran sobrevivir, propagarse y/o volverse dominantes en dicha zona o cultivo. Alternar o combinar la aplicación de este producto con fungicidas de diferente modo de acción, pueden evitar o demorar la aparición o el desarrollo de resistencia.

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido, en el caso de ENVASES RÍGIDOS (bidones, botellas) haga el "triple lavado" o "lavado a presión" del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perforar el envase en su base para evitar su reutilización como tal. Separe las tapas de los envases para llevar por separado. Trasladar los envases al comercio que se los vendió o centro de acopio más cercano. Por más información contactarse con CAMPOLIMPIO al 29254539 o info@campolimpio.org.uy

RECOMENDACIONES DE USO: Generalidades del producto, modo y mecanismo de acción.

Generalidades del producto, modo y mecanismo de acción: El azufre mojable AZUFRUT 80 WDG es un fungicida apto para el control de oidios y otras enfermedades a hongos en diversos cultivos. La adecuada y homogénea finura de sus partículas, así como su formulación, le confieren al producto una mejor acción fungicida, buena distribución y adherencia sobre el follaje y resistencia al lavado por lluvia. El producto es eficaz aun a bajas temperaturas.

INSTRUCCIONES DE USO:

Cultivo	Enfermedades		Dosis gr/100 L agua	Momento de aplicación
	Nombre Común	Nombre Científico		
Uva (<i>Vitis vinifera</i>)	Oidio	<i>Uncinula necator</i>	200	Aplicar después de la brotación en forma preventiva.
			300 a 400	Aplicar en viñas ya atacadas desde el inicio de la brotación
Manzana (<i>Malus domestica</i>) (Suckow) Borkh.), Pera (<i>Pyrus communis</i> L.)	Oidio	<i>Podosphaera leucotricha</i>	500 a 700	Cuando se aplica en prefloración.
			300 a 400	Cuando se aplica después de caída de pétalos
Durazno (<i>Pernus persica</i>)	Oidio	<i>Sphaerotheca pannosa var. persicae</i>	200 a 400	Aplicar desde caída de pétalos.
Pepino (<i>Cucumis sativus</i>), Melón (<i>Cucumis melo</i>) Zapallo (<i>Cucurbita máxima</i>) Zapallito (<i>Cucurbita máxima</i> var. zapallito), Sandía (<i>Citrullus lanatus</i>)	Oidio	<i>Erysiphe cichoreacearum</i>	200 a 400	Aplicar cuando se observen los primeros síntomas.
Naranja (<i>Citrus sinensis</i> L.) (Osbeck), Limón (<i>Citrus x limon</i> L.) (Osbeck), Mandarina (<i>Citrus reticulata</i> Blanco)	Acaro plateado Acaro del tostado	<i>Amychus veranii</i> <i>Phyllocoptrut oleivora</i>	100 a 200	Como preventivo: en prefloración y a caída de pétalos. Se recomienda una pulverización adicional con la menor dosis.

Numero, frecuencia o espaciamiento de aplicaciones: cada 7 a 10 días.

Modo de preparación y técnica de aplicación:

AZUFRUT 80 WDG debe ser aplicado con agua. Para preparar la mezcla, llene el depósito de la pulverizadora con agua hasta el 75% de su capacidad. Luego con el agitador en marcha agregue AZUFRUT 80 WDG, complete con agua y mantenga la agitación durante la aplicación. Tamaño de gota mínimo a ser utilizado: 250 micrones de DMV. Dicho valor se ajustará hacia arriba según las condiciones climáticas en el momento de aplicar el producto y/o dependiendo del producto aplicar.

Restricciones Legales para la Aplicación de Productos Fitosanitarios

No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. -



FIRMA REGISTRANTE:

SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY
Brigadier General Fructuoso Rivera (Ruta 5) N° 7451 esq. Atuna, Montevideo
Tels: 2508 6322 - 2508 8866
Fax: 2508 6550 - E-mail: saudu@saudu.com.uy
Web: www.saudu.com.uy



CIUDADO



CIUDADO

