

C PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Clasificación Toxicológica Aguda: MODERADAMENTE PELIGROSO CLASE II (DOS) IPCS / OMS 2019
Antídoto: No tiene antídoto.
Primeros Auxilios: En caso de ingestión, No provocar el vómito. Procure asistencia médica inmediata. Si está consciente enjuague la boca.

-En caso de contacto con los ojos. Leva dejando correr abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel. Quite la ropa contaminada y lave la piel dejando correr abundante agua durante 15 minutos. En caso de inhalación, Retire a la persona del ambiente contaminado y llévelo a un lugar bien ventilado. En todos los casos llame al CIAT; teléfono 1722, por otras indicaciones.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT APORTANDO NOMBRE COMERCIAL O NUMERO DE REGISTRO, TELÉFONO 1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:
Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.

No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados que hayan tenido contacto con el producto. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:
Usar guantes de nitrilo. Usar mameluco impermeable exclusivo para la tarea que permita el intercambio de calor de material, fácilmente lavable y disponer de recambio en caso de accidente. Usar botas por dentro del mameluco. Usar careta antiparras y máscara de tipo N100 con filtros de partículas y vapores orgánicos. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto luego de cada aplicación y en el lugar de trabajo evitando la contaminación del trabajador y su familia.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y polinizadores, lombrices:

A) Medidas Generales: No producir deriva. No lavar ni vaciar equipos de aplicación en lagos, ríos, otras fuentes de agua o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagües naturales. En caso de derrame durante la aplicación, contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. Llamar a DINACEA, teléfono 29006136 int. 4600.

La protección de los polinizadores es necesaria para la producción sostenible de alimentos.

B) Peligrosidad del ingrediente activo: TOXICIDAD PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS: MODERADAMENTE TOXICO
A las dosis recomendadas, el riesgo es aceptable. No sembrar en áreas de desagües y surcos de erosión. No sembrar a una distancia de cuerpos de agua menor a 10 metros en aplicaciones terrestres y 30 metros aplicaciones aéreas. No lavar sembradoras en lagos, ríos y otras fuentes de agua, ni en la cercanía de los mismos.

TOXICIDAD PARA POLINIZADORES: ALTAMENTE TOXICO. A las dosis recomendadas, el riesgo es aceptable. Avisar con anticipación al apicultor con colmenas dentro de los 60 m en áreas con siembras neumáticas. Usar coadyuvantes que mejoren la adherencia del producto a la semilla.

TOXICIDAD PARA AVES: ALTAMENTE TOXICO. A las dosis recomendadas, el riesgo no es aceptable. Las semillas tratadas con este producto, deberán ser enterradas en el suelo utilizando sembradoras de surco o tapadas con restos vegetales. Toda semilla tratada con este producto deberá ser cuidadosamente manejada, evitando derrames en los caminos o puntos de carga de las sembradoras. Si los hay deberán enterrarse inmediatamente para evitar el daño a las aves.

TOXICIDAD PARA ORGANISMOS DE SUELO (Lombrices): MODERADAMENTE TOXICO. A las dosis recomendadas, el riesgo es aceptable.

C) Destino Ambiental: Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y polinizadores, lombrices: Alta solubilidad en agua. Persistente en suelo. Alta lixiviableidad. Bajo potencial de bioacumulación.

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido, en el caso de ENVASES RIGIDOS (Bidones, botellas) realice el "triple lavado" o "lavado a presión" del mismo, volcando el líquido del lavado en el tanque de la pulverizadora. Luego perfere el envase en su base para evitar su reutilización como tal y separe las tapas. En el caso de los ENVASES FLEXIBLES (bolsas y paquetes de fitosanitarios) se entregan sin lavar y por separado. Trasladar los envases al centro de recepción del comercio que se los vendió o al centro de acopio "CAMPOLIMPIO" más cercano (www.campolimpio.org.uy) **cumpliendo con los establecido en el decreto del MA número 152/013.**

Productos vencidos y/o obsoletos: Para los productos próximos a vencer, se deberá contactar directamente con el registrante de forma de analizar su revalida (Resolución MGAP 120/2016). En caso de poseer productos obsoletos contactarse directamente con el Plan de Gestión CAMPOLIMPIO al 092146145 o al info@campolimpio.org.uy. Recuerde llevar un correcto control de stock priorizando el uso de los productos próximos a vencer.

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-Sustancia Tóxica"



MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELÉF: 1722
CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LA OS RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA,
PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA

"PROHIBIDO SU USO PARA TRATAR GRANOS DESTINADOS A LA ALIMENTACION HUMANA O ANIMAL O PARA LA INDUSTRIALIZACION", El lavado no elimina el tóxico de la semilla tratada".

BAGUAL 70% WS

CURASEMILLAS INSECTICIDA

VENTA EXCLUSIVA BAJO RECETA PROFESIONAL

POLVO DISPERSABLE PARA TRATAMIENTO DE SEMILLA (WS)

Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Concentración (% p/p)	Concentración (g/L)
Imidacloprid	70	-

GRUPO QUIMICO A QUE PERTENECE EL INGREDIENTE ACTIVO: NEONICOTINOIDE

Grupo IRAC	Nro.	Aptitud
IRAC	4A	Insecticida

“USO AGRÍCOLA” LEA ATENTAMENTE ETIQUETA (Y
EN EL CASO FOLLETO - SI EXISTE) ANTES DE
USAR EL PRODUCTO.

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MGAP

Nº DE REGISTRO: 3208



FIRMA REGISTRANTE:

SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY
Brigadier General Fructuoso Riviera (Ruta 5 km 17500) N° 7451 esq. Altuna. Montevideo

Tels: 2508 6322 Fax: 2508 6322 Int.130

E-mail: saudu@saudu.com.uy

Web: www.saudu.com.uy

Nº DE LOTE:

FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

TIEMPO VALIDEZ: 2 AÑOS

NOMBRE DEL FABRICANTE: NANJING HAIGE CHEMICAL CO., LTD

PAIS DE ORIGEN: CHINA



NOCIVO

B RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades del producto, modo y mecanismo de acción:

Bagual 70% WS es un insecticida sistémico en la planta con prolongado efecto residual. Actuando en los insectos por ingestión y contacto. Es un modulador competitivo del receptor nicotínico de la acetilcolina (nAChR). Se une al sitio de acetilcolina en los nAChR, causando una variedad de síntomas, desde hiperecitación hasta letargo y parálisis. La acetilcolina es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central de los insectos.

Instrucciones de uso:			
Cultivo o sitio de aplicación	Plagas/Enfermedades/Malezas controladas		Dosis grs/100 kg de semilla
	Nombre común	Nombre científico	
Maiz (Zea mays L.) Sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench.) Girasol (Helianthus annuus L.)	Gusano alambre Bicho torito Isoca chica	<i>Conoderus spp</i> <i>Diloboderus abderus</i> <i>Cyclocephala signaticollis</i>	500-600
Algodón (Gossypium hirsutum L.)	Pulgón del algodónero	<i>Aphis gossypii</i>	400
Avena (Avena sativa L.) Trigo (Triticum aestivum L.) Cebada (Hordeum vulgare L.)	Bicho torito Isoca chica Pulgón verde de los cereales Pulgón de la espiga	<i>Diloboderus abderus</i> <i>Cyclocephala signaticollis</i> <i>Schizaphis graminum</i> <i>Sitobium avenae</i>	80-90
Maiz (Zea mays L.)	Chicharrita del maíz	<i>Daibulus maidis</i>	700

Momento(s) de aplicación: Se aplica a la semilla previo a la siembra.

Frecuencia, número o espaciamiento de las aplicaciones, si corresponde: Una aplicación previa a la siembra

Modo de preparación y técnica de aplicación: El tratamiento de la semilla se puede realizar en tambores o maquinarias específicas para dicho propósito. Para el tratamiento por vía húmeda se recomienda diluir a las dosis en un volumen de entre 500 ml y 2000 ml de agua por 100 kg de semilla. Realizar el tratamiento en local aireado, limpio y específico para tal fin.

Restricciones Legales para la Aplicación de Productos Fitosanitarios

Resol. N°129 de 27/2/2008 -

Prohibir el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedarios.-

Compatibilidad y fitotoxicidad:

En caso de desconocer, tener dudas sobre el comportamiento físico-químico o fitotoxicidad de la mezcla, o querer conocer la compatibilidad en la aplicación de los fitosanitarios a agregar al tanque de pulverizar, se debe hacer una prueba a pequeña escala en una botella limpia antes de su aplicación en todo el cultivo. Hecha la mezcla a escala, se agita y posteriormente se deja en reposo y se analiza a 1, 5, 10 y 30 minutos. Si luego de 1 minuto, la mezcla se corta, no deberá aplicarse. Si el corte está entre los 5 y 10 minutos, con agitación se puede aplicar. Si a los 30 minutos, no se cortó, se considera que la mezcla es estable.

Tiempos de espera: No corresponde por su forma de uso.

Tiempo de reingreso al cultivo: No corresponde por su forma de uso.

Otras informaciones necesarias respecto al uso:

Lavado de equipo post-aplicación: En la última carga, tener en cuenta que el sobrante del caldo sea lo más reducido posible. Diluir el sobrante x 5 y aplicarlo en la cabecera de la chacra, hasta que vuelva a quedar un residuo de pocos litros en el tanque. Una vez reducido el residuo, abrir la canilla del tanque y eliminarlo al costado de la chacra aplicada, sin que dicho líquido se dirccione a fuentes de agua. Una vez hecho esto, se puede higienizar el equipo.

PREVENCIÓN DE RESISTENCIA: Se recomienda rotar o combinar con otros ingredientes activos de diferentes mecanismos de acción, para prevenir la ocurrencia de biotipos resistentes



FIRMA REGISTRANTE:

SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY
Brigadier General Fructuoso Riviera (Ruta 5 km 17500) N° 7451 esq. Altuna. Montevideo
Tels: 2508 6322 Fax: 2508 6322 Int.130
E-mail: saudu@saudu.com.uy
Web: www.saudu.com.uy

