

FUNGICIDA

PRINCIPIO ACTIVO	% PESO
BENOMYL	50%

Venta autorizada por el Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca.

Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta.

Número de lote:	Nombre del fabricante:
Contenido Neto:	País de origen:
Fecha de Vencimiento:	



BENOMYL 50 SAUDU es un fungicida sistémico pose acción preventiva y curativa.

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	OBSERVACIONES x 100 Lts Agua
	Nombre común	Nombre científico		
Manzano y Peral	Sarna	Venturia spp	45 - 60	De puntas verdes a caída de los pétalos, pulverizar cada 7 días. Luego cada 14 días
	Oidio	Podosphaera leucotricha	70-100	a) Pimpollo rosado. b) Caída de los pétalos c) 14 días después Luego pulverizar cada 10 Días.
Manzano	Podredumbre	Penicillium expansum	100-120	Baños o pulverización enseguida de la cosecha.
Vid	Podredumbre	Botrytis cinerea	60	a) Racimo formado b) Plena floración c) 17 días después Luego del envero, si las condiciones son favorables, pulverizar de acuerdo a aplicación.
Citrus	Sarna	Sphaceloma fawcettii	45-60	a) Botón floral b) pétalos caídos c) 20 días después
Citrus	Moho verde	Penicillium digitatum	100-120	Baños o pulverización enseguida de la cosecha.
Citrus	Moho azul	Penicillium italicum	100-120	Baños o pulverización enseguida de la cosecha.
Trigo	Golpe blanco	Fusarium sp	0,5 kg/há	Espigazón.
Cebolla	Mancha blanca	Botrytis spp	45-60	Pulverizaciones según época de aplicación.
Frutilla Tomate	Moho gris	Botrytis cinerea	45-60	Pulverizaciones según época de aplicación
Remolacha y acelga	Viruela	Ceroaspora beticola	250-500 gr/há	Pulverizaciones según época de aplicación.
Tomate	Viruela	Septoria lycopersici	45-60	Pulverizaciones según época de aplicación.
Arroz	Quemado	Pyricularia oryzae	1 kg/há	1) al hinchar la espiga 2) a la emergencia de la espiga.

Modo de aplicación: Mezclado con agua.

Método de aplicación: Para cultivos implantados por método aéreo o terrestre. En Post-cosecha por pulverización o baño, sumergiendo el cajón durante un minuto.

No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 500 mts de cualquier zona urbana o suburbana y centros poblados. Ni inferior a 30 mts de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). Ni a menos de 50 mts del límite del predio de escuelas rurales.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales oleaginosos y forrajeros) a una distancia inferior a 300 mts de cualquier zona urbana o suburbana y centros poblados. No realizar aplicaciones terrestres con maquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 10 mts de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. Ni inferior a 30 mts del limite del predio de escuelas rurales.

Épocas de aplicación: Cuando se dan las condiciones climáticas favorables para el desarrollo de los diferentes hongos o al aparecer los primeros síntomas de la enfermedad, en este caso repetir los tratamientos a intervalos de 7 a 14 días o según sistema de adverbencia.

Tiempo de espera: 14 días.

Contraindicaciones: La aplicación continuada del producto puede crear resistencia.

Compatibilidad: En plantas difíciles de mojar puede resultar conveniente el agregado de un humectante

Es compatible con la mayoría de los Insecticidas y Fungicidas de uso común. No compatible con mezcla sulfocalcica, caldos bordes.

Precauciones, indicación de veneno y antídotos:

- I) Escala de toxicidad: Categoría II-(dos)
- II) LEA LA ETIQUETA
- III) En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico:
Concurrir al médico llevando la etiqueta o envase del producto.

MEDIDAS A TOMAR COMO PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, provocar el vómito, introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.

Consultar al CIAT (Hospital de Clínicas, 7º Piso) ☎ 1722

Precauciones de empleo y destrucción de envases: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.

No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos pulverizadores con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto. Guardar el producto en su envase original, etiquetado, en lugar fresco y seco, evitando la luz directa del sol. Quemar los envases vacíos evitando inhalar los vapores de combustión o enterrarlos lejos de fuentes de agua. Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Manténgase fuera del alcance de los niños, personas irresponsables y animales. No almacenar con alimento, utensilios domésticos o vestimentas.

Toxicidad para abejas: No tóxico

Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta.

Nota al comprador: Se garantiza la composición y calidad de este producto. Respete los usos, dosis, condiciones y precauciones de empleo mencionados en esta etiqueta, que han sido determinados en función de las características del producto y las aplicaciones para las cuales han sido recomendadas. Como su uso, manejo y almacenamiento se realiza fuera del control de la firma registrante así como del fabricante, estos no se hacen responsables por daños o perjuicios que pueden derivarse del uso, manejo o almacenamiento de este material. El comprador asume todo riesgo en el uso, manejo o almacenamiento de este producto, quedando por entendido que el comprador ha aceptado estas condiciones.

