

CHACAL 50 WP

FUNGICIDA

Principio Activo	Porcentaje en peso	Contenido en volumen (ISO)
PROCIMIDONA	50 %	—

USO AGRÍCOLA
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO, SI EXISTE) ANTES DE USAR EL PRODUCTO



FIRMA REGISTRANTE:

SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY
Brigadier General Fructuoso Rivera (Ruta 5) N° 7451 esq. Atuna. Montevideo
Tel: 2508 6322 - 2508 8866
Fax: 2508 6550 - E-mail: saudu@saudu.com.uy
Web: www.saudu.com.uy

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Clasificación Toxicológica Aguda: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL, IPCS/OMS 2019. Antídotos: No tiene antídoto. Primeros auxilios: En caso de ingestión: NO provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos: lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado. **EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT APORTANDO NOMBRE COMERCIAL O NUMERO DE REGISTRO, TELÉFONO 1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.** Otras advertencias: C8- Puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto. Puede causar defectos genéticos. **Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:** Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados que hayan tenido contacto con el producto. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. **Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:** Usar guantes de nitrilo, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. **Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y polinizadores, lombrices:** A) Medidas Generales: No producir deriva. No lavar ni vaciar equipos de aplicación en lagos, ríos, otras fuentes de agua o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagües naturales. En caso de derrame durante la aplicación, contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. Llamar a UNICEA, teléfono 29006136 int. 4600. La protección de los polinizadores es necesaria para la producción sostenible de alimentos.

GRUPO QUÍMICO A QUE PERTENECE EL INGREDIENTE ACTIVO: DICARBOXIMIDA
FORMULACION: POLVO MOJABLE

Grupo FRAC	2	Aptitud FUNGICIDA
------------	---	-------------------

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MCAP.
REGISTRO N° 3256

N° DE LOTE:
FECHAS DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO:
TIEMPO DE VALIDEZ: 2 AÑOS
FECHA DE VENCIMIENTO:
NOMBRE DEL FABRICANTE: JIANGXI HEYI CHEMICAL CO., LTD
PAIS DE ORIGEN: CHINA

B) Peligrosidad del ingrediente activo/formulado: TOXICIDAD PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS: MODERADAMENTE TÓXICO

Medidas de mitigación: No aplicar el producto en condiciones climáticas que favorezcan la escorrentía (pronósticos de lluvia dentro de las 24 horas de aplicación) o la deriva del producto. No aplicar el producto en surcos de erosión, desagües o áreas que favorezcan el escurrimiento a cuerpos de agua adyacentes. No aplicar dentro del área de la zona BUFFER (10 metros para aplicaciones terrestres y 30 metros para aplicaciones aéreas). A las dosis recomendadas no presenta riesgo en organismos acuáticos. **TOXICIDAD PARA AVES:** PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. **TOXICIDAD PARA POLINIZADORES:** PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. **TOXICIDAD PARA ORGANISMOS DE SUELO (Lombrices):** PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. **C) Destino Ambiental:** Solubilidad en agua: baja. Lixiviación: Alto. Movilidad en suelo: Intermedia. Coeficiente de partición octanol/agua: No se acumula en el tejido adiposo de peces. Persistencia en suelo: Baja. Persistencia en agua: Baja. Potencial de volatilización: baja. **Intrucciones de almacenamiento:** guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas raciones, fertilizantes u otros similares



MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722 CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS NO LAVAR LOS EQUIPOS E APLICACIÓN ENS LADOS RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTO A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA



CIUDADO



Compatibilidad y fitotoxicidad:

No es compatible con productos de reacción alcalina fuerte. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico-químico o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo en una botella limpia. Hecha la mezcla a escala, se agita y posteriormente se deja en reposo y se analiza a 1, 5, 10 y 30 minutos. Si luego de 1 minuto, la mezcla se corta, no deberá aplicarse. Si el corte está entre los 5 y 10 minutos, con agitación se puede aplicar. Si a los 30 minutos, no se cortó, se considera que la mezcla es estable.

Constante de disociación: no se disocia

Tempos de espera: FRUTILLA: 30 DÍAS; LECHUGA: 21 DÍAS; CEBOLLA Y UVA: 25 DÍAS.

Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al cultivo hasta que haya transcurrido como mínimo 24 horas.

PREVENCIÓN DE RESISTENCIA Cuando fungicidas de un mismo modo de acción, son usados repetidamente en las mismas zonas o sobre el mismo cultivo, puede producirse la aparición de biotipos resistentes, que logran sobrevivir, propagarse y/o volverse dominantes en dicha zona o cultivo. Alternar o combinar la aplicación de este producto con fungicidas de diferente modo de acción, pueden evitar o demorar la aparición o el desarrollo de resistencia.

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido, en el caso de ENVASES RÍGIDOS (bidones, botellas) haga el "triple lavado" o "lavado a presión" del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perforar el envase en su base para evitar su reutilización como tal. Separe las tapas de los envases para llevar por separado. Trasladar los envases al comercio que se los vendió o centro de acopio más cercano. Por más información contactarse con CAMPOLMPIO al 29254539 o info@campolmpio.org.uy

Generalidades del producto, modo y mecanismo de acción:

CHACAL 50 WP, es un fungicida sistémico con propiedades protectoras y curativas en el control de enfermedades, en especial causadas por Botrytis y Sclerotinia. El producto puede ser absorbido por las raíces y trasladado hacia las hojas y flores. CHACAL 50 WP actúa inhibiendo la germinación de esporas y el desarrollo del micelio. Es un inhibidor de la síntesis de triglicéridos en hongos.

Instrucciones de uso:

Cultivo	Enfermedad		Dosis g/100 L de agua
	Nombre Común	Nombre Científico	
Frutilla (<i>Fragaria ananassa</i>)	Moho gris	<i>Botrytis cinérea</i>	75 a 100
Lechuga (<i>Lactuca sativa</i>)	Podredumbre	<i>Sclerotinia sclerotium</i>	100
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	Podredumbre del cuello	<i>Botritis alli</i>	150
Uva (<i>Vitis vinifera</i> L.)	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	100



FIRMA REGISTRANTE:

SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY
Brigadier General Fructuoso Rivera (Ruta 5) N° 7451 esq. Atuna. Montevideo
Tel: 2508 6322 - 2508 8866
Fax: 2508 6550 - E-mail: saudu@saudu.com.uy
Web: www.saudu.com.uy



CIUDADO

