

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes u otros similares. Debe estar claramente señalado con un cartel que indique "Cuidado-Veneno" (calavera).

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:

Instrucciones de uso: CIMARRON 24 SC es un herbicida hormonal, con acción sistemática en malezas de hoja ancha tanto anuales como perennes. Se utiliza en diversos cultivos que a continuación se detallan y en áreas no cultivadas.

Cultivo	Malezas		Dosis/ha	Observaciones (2)
	Nombre Común	Nombre Científico		
Trigo-cebada	Abrojo Grande	Xanthium Cavanillensii	75-100	Cultivo de 3 a 5 hojas + Aky 60 WD.G. y al comienzo del macollaje con Herbiamina
	Cardo Negro	Cirsium Vulgare		
	Cepa Caballo	Xanthium Spinosum		
	Cicuta Negra	Ammi Majus		
	Correhuela	Convolvulus Arvensis		
	Chamico	Datura Fenox		
	Enredadera anual	Polygonum Convolvulus		
	Flor Morada	EchiumPlantagineum		
	Mostacilla	Rapistrum Rugosum		
	Rabano	Raphanus Raphanistrum		
Alpiste, praderas de gramíneas	Sanguinaria	Polygonum Aviculare	100-125 cc/Ha	Con cultivo macollado + Herbiamina
	Viznaga	Ammi Biznaga		
Maíz y sorgo	Yuyo Colorado	Amaranthus Quitensis	100-125	Entre dos a 6 hojas del cultivo o 20 cm de altura complementando con 150 cc de Herbiamina

PREVENCIÓN DE RESISTENCIA: Se recomienda rotar con otros herbicidas de diferente mecanismos de acción, para prevenir la ocurrencia de biotipos resistentes. Se debe observar la presencia de malezas sin controlar, investigando la causa de su permanencia. Elimine las malezas sobrevivientes para evitar su propagación.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo cultivo.

TIEMPO DE ESPERA: Trigo, cebada, arroz, maíz y sorgo: no tiene. Para pastoreo: deben transcurrir 21 días. En caso que el cultivo o sus subproductos estén destinados a la exportación deberán tenerse en cuenta el Límite Máximo de Residuos (LMR) del país de destino y el tiempo de espera que corresponda a ese valor de tolerancia.

TIEMPO DE REINGRESO AL CULTIVO: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente, dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

MODO DE PREPARACIÓN Y TÉCNICA DE APLICACIÓN: Llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad con agua, luego verter la cantidad necesaria y con los agitadores en marcha completar el llenado del tanque con agua. Si se usan AKY 60 WG, Herbiamina 500 o MCPA 40 SAUDU NO mezclar los productos puros agregar estos de agregado al CIMARRON 24 SC.

No efectuar el llenado con agua de las maquinarias de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. Con equipos terrestres usar pastillas de abanico plano, preferentemente antideriva, volumen de agua de 80 a 100 lts/ha, desiendo un número de gotas por cm2 de 20 a 30. Con equipos aéreos aplicar no menos de 12 lts/ha. No aplicar con vientos superiores de 10 km/hora. o realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

CIMARRON 24 SC

HERBICIDA

Principio Activo	Porcentaje en peso	Contenido en volumen
PICLORAM, SAL POTÁSICA	23,96 %	278 g/l
EQUIVALENTE EN PICLORAM	20,7 %	240 g/l

CONCENTRADO SOLUBLE
GRUPO QUÍMICO: AC PICOLINICO
PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MGAP
REGISTRO Nº 3488



FIRMA REGISTRANTE:

SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY
Brigadier General Fructoso Rivera (Ruta 5 Km 17500) N° 7451 esq. Altaña, Montevideo
Tels: 2588 6322 Fax: 2588 6322 Int.130
E-mail: saudu@saudu.com.uy
Web: www.saudu.com.uy

Contenido Neto: 5 Lts.

Número de lote:

País de origen: CHINA

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

Nombre del fabricante:
LIER CHEMICAL Co., Ltd.

Precauciones y Advertencias:

Clasificación Toxicológica: Poco peligroso en el uso normal IPCS/OMS, 2009.

Antídotos: No tiene antídoto.

Primeros auxilios: En caso de ingestión: No provocar el vómito.

Contacto con la piel: Lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de usar.

Contacto ocular: Lavado a chorro con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.

En caso de inhalación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar ventilado.

En caso de intoxicación: Llamar al CIAT, teléfono 1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, o el folleto o el envase

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:

Usar guantes, botas, caretas, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:

No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva. Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.

Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.

No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

No contaminar lagos, ríos u otras fuentes corrientes de agua con restos de productos.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

Ecotoxicología:

Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico

Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico

Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico

Una vez vaciado el contenido del envase haga el "triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perforo el envase para evitar su reutilización como tal. Traslade los envases con triple lavado al centro de acopio más cercano.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEF. (02) 1722.

CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE GANADERÍA AGRICULTURA Y PESCA.

USO AGRÍCOLA. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO - SI EXISTE-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO.



CUIDADO

