

Precauciones, indicación de veneno y antídoto:

- I. Escala de toxicidad: POCO PELIGROSO EN SU USO HABITUAL IPCS/OMS 2004.
- II. Antídotos: No tiene antídoto específico.

Medidas a tomar como primeros auxilios:

En caso de ingestión provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. -En caso de contacto con la piel retirar las ropas contaminadas y lavar con agua tibia y jabón". En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante durante al menos 15 minutos. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado".

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros, instrucciones de almacenamiento y manejo de envases:

Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No destapar los picos pulverizadores con la boca.

Disposición final de envases:

Destruir los envases vacíos y enterrarlos lejos de fuentes de agua.

"Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas"

"En caso de intoxicación llamar al CIAT tel. 1722.

Concurrir al médico llevando la etiqueta, el folleto o el envase"

"No transportar ni almacenar con alimentos, utensilios domésticos o vestimentas"

"No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua"

"Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta"

"Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca"

"Uso agrícola"

"Lea atentamente la etiqueta (y el folleto adjunto si existe) antes de usar el producto"

Advertencias sobre protección del medio ambiente y toxicidad

para peces, aves y abejas: Poco tóxico

NOTA: La firma registrante garantiza la calidad de este producto, como su uso, manejo y almacenamiento se realizan fuera del control de la firma ésta no se hace responsable por daños y perjuicios que puedan derivarse del empleo y almacenamiento de este producto. El Comprador asume todo riesgo en el uso, manejo y almacenamiento de este producto, quedando por entendido que el comprador ha aceptado estas condiciones.

FOLDAN 80 WDG

FUNGICIDA

Principio Activo	Porcentaje en peso
FOLPET	80 %

GRUPO QUIMICO: FTALIMIDA GRANULOS DISPERSABLES

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aislado de plaguicidas, semillas, forrajes o fertilizantes. No trasvasar a otros envases.

Firma registrante:



Avda. República de Corea 2962

Tels.: 508 63 22 - 508 88 66

Fax: 508 6550 - E-mail.: saudu@saudu.com.uy

Registro N° 3222

Contenido Neto:

Nombre del fabricante:

Fecha de
Vencimiento:

País de origen:

Recomendaciones de uso: Generalidades, FOLDAN 80 WDG Es un fungicida preventivo de contacto, por lo cual se recomienda su aplicación antes de la aparición de enfermedades o la aparición de los primeros síntomas. Su uso más común es en viñedos por su amplio espectro, pudiendo ser utilizado también en frutales y cultivos hortícolas.

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (1)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
MANZANO PERAL	Sarna	Venturia sp.	160 gr. / 100 lts ó 2,5 a 3 kg/há
	Oidio	Phodosphaera Leucotricha	
PREFLORACION.- De punta verde a pimpollo rosado a las dosis mayores POST FLORACIÓN.- Desde caída de los pétalos cada 10 a 14 días. No pulverizar en el pico de la floración.			
FRUTILLA	Viruela	Mycosphaerella Fragariae	160 a 180 grs. / 100 lts
CEBOLLA	Mildiu	Peronospora Detructor	160 gr. / 100 lts
MELON	Mildiu	Pseudoperonospora Cubensis	160 gr. / 100 lts
TOMATE	Tizon temprano	Alternaria solani	120 a 150 grs. / 100 lts
	Tizon tardio	Phytophthora Infestans	
Aplicar preventivamente o desde aparición de primeros síntomas			
PAPA	Tizon temprano	Alternaria solani	1,2 a 1,5 kg/ha
	Tizon tardio	Phytophthora Infestans	
Desde que las plantas tiene 10 cm de altura repitiendo cada 7 a 10 días mientras duren las condiciones favorables.			
CITRUS	Sarna Melanosis Antracnosis Mancha Grasienta	Spahaceloma fawcetti Phomopsis citri Colletotrichum Gloeosporioides Mycosphaerella citri	150 a 180 grs. / 100 lts ó 2,5 a 3 kg/há
Aplicar en botón floral, caída de pétalos y 20 días después.			
VID	Mildiu Antracnosis	Plasmopara viticola	160 a 180 grs. / 100 lts ó 1,6 a 1,8 kg/há
Desde que los brotes tienen 7 a 10 cms. de largo cada 7 a 10 días			
VID	Excoriosis	Phoma reniformis	
Desde comienzo de brotación hasta que las inflorescencia sean bien visibles.			
VID	Pobredumbre gris	Botrytis cinerea	
De fin de floración a cuajado; antes del cierre del racimo; al comienzo del envero y 4 semanas antes de cosecha			

(1) -Las dosis por 100 lts para aplicación directa al cultivo se refieren a aplicaciones de alto volumen. Cuando se emplee equipos aplicadores de bajo volumen se deberá mantener la misma cantidad de producto comercial por unidad de superficie.

Compatibilidad y Fitotoxicidad: No mezclar con productos de reacción alcalina (ejemplo caldo bordelés o polisulfuro de calcio). Si la compatibilidad es desconocida, o si se tienen dudas sobre la mezcla, probar en una pequeña escala, tanto para compatibilidad física como para fitocompatibilidad.

No usar luego de una aplicación con aceite porque reduce fungitoxicidad.

Tiempo de espera: En uvas para vinificar 20 días.- En los demás cultivos no tiene.

Tiempo de reingreso al cultivo: No entrar al cultivo hasta que se haya secado el depósito del producto aplicado"

Modo de preparación y técnica de aplicación: Llenar hasta la mitad con agua el tanque de la atomizadora y con los agitadores en marcha agregar la cantidad necesaria de FOLDAN 80 WDG; luego completar el llenado con agua. puede aplicarse con equipos terrestres o aéreos.-No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana, sub-urbana o centro poblado.

