

IPRODION 500 SC

FUNGICIDA SUSPENSIÓN CONCENTRADA

Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Porcentaje en peso:	Contenido en volumen:
IPRODIONE	45,1%	500 g/l

"USO AGRÍCOLA" LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO -SI EXISTE-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO



SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY
Brigadier General Fructuoso Riviera (Ruta 5 km 17500) N° 7451 esq. Altuna, Montevideo
Tels: 2508 6322 Fax: 2508 6322 Int.130
E-mail: saudu@saudu.com.uy
www.saudu.com.uy

GRUPO QUÍMICO A QUE PERTENECE EL INGREDIENTE

ACTIVO: DICARBOXIMIDAS

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL

MGAP.

N° REGISTRO 4224

N° LOTE:

FECHA FABRICACIÓN:

TIEMPO VALIDEZ PROD: 2 AÑOS

FECHA VENCIMIENTO:

FABRICANTE: CHINA JIANGSU INTERNATIONAL ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION GROUP LTD.

C) Toxicidad para abejas: VIRTUALMENTE NO TÓXICO.

D) Toxicidad para organismos de suelo (lombrices): LIGERAMENTE TÓXICO Medidas de mitigación: Aplicaciones foliares: Utilizar solo en cultivos con cobertura foliar o en ambientes controlados donde la deriva al suelo sea mínima. Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora.

Luego perfore el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.



"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS

INEXPERTAS".-EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF:

1722". "CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O

EL ENVASE".-NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".-NO

LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS

FUENTES DE AGUA".-PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS

ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA"

RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades del producto, modo y mecanismo de acción: IPRODION 500 SC es un fungicida de contacto, indicado para las enfermedades que se detallan en el cuadro

INSTRUCCIONES DE USO:

Cultivo	Enfermedad		DOSIS
	Nombre Común	Nombre Científico	
Arándanos (<u>Vaccinium</u> <u>Corymbosum</u> L.) Vid (<u>Vitis</u> vinifera L.)	Podredumbre gris	<u>Botrytis cinérea</u>	150 cc/100Lts
Duraznero (<u>Prunus</u> pérsica (L.) Batsh), Nectarino (<u>Prunus</u> pérsica var. Nucipersica), Manzana (Malus domestica (Suckow) Borkh) Peral (Pyrus communis L.)	Monilia	<u>Monilinia fructicola</u>	100 cc/100Lts
Frutilla	Podredumbre del almacenamiento	<u>Botrytis sp</u>	100-150 cc/100 Lts
Tomate	Podredumbre gris	<u>Botrytis cinérea</u>	150cc/100Lts o 2Lts/Ha

Momento y frecuencia de aplicación:

Arándanos: Desde inicio de floración, repitiendo hasta que cesen las condiciones favorables.

Vid: Fin de floración, Antes de cierre de racimo, Envero y 15 a 20 días antes de cosecha

Durazno-Manzano y Pera:

Floración: desde el inicio de floración hasta caída de pétalos cada 15 días, Para el control de Monilia, las aplicaciones pueden prolongarse hasta 15 días previo a cosecha, Tratamiento post cosecha: tratamiento de inmersión o ducha con abundante agua inmediatamente después de cosechada la fruta y durante un tiempo mínimo de un minuto, procurando que los frutos queden totalmente cubiertos por la suspensión, Usar dosis mayor en caso de alta infestación o condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad, Cambiar el caldo del baño cuando presente suciedad, Almacenar la fruta en cámara fría.

Frutilla y Tomate, Realizar aplicaciones durante el periodo de floración hasta comienzo de maduración.

Compatibilidad y fitotoxicidad: Con la mayoría de los plaguicidas de uso común que sean de reacción ácida, No mezclar con productos de reacción alcalina y con Aceites, En caso de realizar mezclas, diluir los componentes de la misma por separado, agregándolos al tanque de la maquina con los agitadores en marcha, Tiempo de reingreso al cultivo:

No ingresar al área tratada, hasta que la pulverización haya secado, dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

Modo de preparación y técnica de aplicación:

Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad y luego con los agitadores en marcha agregar la cantidad necesaria de IPRODION 500 SC y completar el llenado con agua. Preparar únicamente lo estimado para el día. Si el preparado queda en reposo durante varias horas, es necesario hacer funcionar el agitador o retorno durante algunos minutos, antes de recomenzar la aplicación. Por Resolución MGAP N° 129 de fecha 14 de mayo de 2004 se encuentran prohibidas las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana, suburbana y centro poblado. También se encuentran prohibidas las aplicaciones terrestres mecanizadas de productos fitosanitarios en cultivos extensivos (Cereales, oleaginosos y forrajeras), a una distancia inferior de 300 metros de cualquier zona urbana, suburbana y centro poblado. Por Resolución MGAP N° 129 de fecha 27 de febrero de 2008 están prohibidas las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). También se encuentran prohibidas las aplicaciones terrestres de productos fitosanitarios con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. Se prohíbe el llenado con agua de las maquinarias de aplicación directamente desde las corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. Por Resolución MGAP N° 188/011 de 25 de marzo de 2011 se encuentran prohibidas las aplicaciones aéreas y terrestres de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivos a menos de 500 metros y 300 metros respectivamente, del límite del predio de los centros educativos.



SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY

Brigadier General Fructuoso Riviera (Ruta 5 km 17500) N° 7451 esq. Altuna. Montevideo

Tels: 2508 6322 Fax: 2508 6322 Int.130

E-mail: saudu@saudu.com.uy

Web: www.saudu.com.uy



CUIDADO



CUIDADO

