

PRECAUCIONES DE USO:

Clasificación Toxicológica: Clase III (Tres) LIGERAMENTE PELIGROSO ,IPCS/OMS, 2009.

Antídotos: No tiene antídoto.

Primeros auxilios: En caso de ingestión provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. En caso de contacto con los ojos lavado a chorro con agua limpia abundante durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel lavar las partes afectadas con abundante agua . Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volverlas a usar. **En caso de inhalación:** retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono 1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, o el folleto o el envase

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos pulverizadores con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto. Guardar el producto en su envase original, etiquetado, en lugar fresco y seco, evitando la luz directa del sol. **Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:** No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación. **Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:** TOXICIDAD PARA AVES: PRÁCTICAMENTE NO TOXICO. TOXICIDAD PARA PECES: LIGERAMENTE TOXICO “Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar. TOXICIDAD PARA ABEJAS: PRÁCTICAMENTE NO TOXICO. Para que el glifosato se degrade inmediatamente que llegue al suelo, el contenido de materia orgánica debe ser superior a 2%.

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase, realice el “triple lavado” del mismo, vertiendo el agua del lavado en la máquina aplicadora. Luego perforo el envase para impedir su reutilización y llévelo al centro de acopio más cercano.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”“EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF. 1722”. “CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE”“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”“NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”.Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca **“USO AGRICOLA”“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**

.

N° DE LOTE:

FECHA DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO:

TIEMPO DE VALIDEZ: 2 AÑOS

FECHA DE VENCIMIENTO:

NOMBRE DEL FABRICANTE: Sichuan Leshan Fuhua Tongda Agro-Chemical Technology CO.,LTD.

PAIS DE ORIGEN: CHINA

PAMPA GOLD

HERBICIDA

CONCENTRADO SOLUBLE

Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Porcentaje en peso:	Contenido en volumen:
Glifosato, Sal dimetilamina	50,6%	608 grs/lt
Equivalente en glifosato	40%	480 grs/lt

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: DERIVADO DE GLICINA

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique “Cuidado–veneno” (calavera).

IMPORTANTE: No realizar mezclas ni almacenar en tanques de hierro galvanizado o acero común, debido a que el producto reacciona con la superficie de los mismos produciendo gases explosivos. En caso de derrame recoger con tierra y/o aserrín para absorción de la sustancia, luego de juntarla, tirarla en el lugar de aplicación, lejos de fuentes de agua y/o probable contaminación de otros cultivos.

PRODUCTO APROBADO POR EL MGAP: REGISTRO N° 4255



SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY

Brigadier General Fructuoso Rivera (Ruta 5 Km 17500) N° 7451 esq. Altuña. Montevideo

Tels: 2508 6322 **Fax:** 2508 6322 Int.130

E-mail: saudu@saudu.com.uy

Web: www.saudu.com.uy

RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: PAMPA GOLD, es un herbicida sistémico no selectivo, que se utiliza para el control de malezas anuales y perennes, tanto de hoja ancha como de gramíneas. PAMPA GOLD se trasloca desde el punto de contacto en el follaje hacia el sistema radical a través del floema. Los efectos se pueden apreciar 5 a 7, amarillamiento y marchitamiento gradual hasta un amarronamiento de la parte verde y un deterioro del sistema radicular. Actúa inhibiendo la síntesis de aminoácidos aromáticos. El glifosato no es absorbido por el sistema radicular ,se inactiva en contacto con el suelo, lo cual le permite implantar cualquier cultivo en el área tratada.

Cultivo	Maleza		Dosis l/Há
	Nombre Común	Nombre Científico	
BARBECHO	-Anuales		1.5 – 2.25 Lts/Ha
	Pasto blanco	Digitaria sanguinalis	
	Capin	Echinocloa sp	
	Brachiaria	Brachiaria sp	
	Yuyo colorado	Amaranthus quitensis	
SOJA (<i>Glycine max</i> L. var. RG)	Verdolaga	Portulaca oleracea	2 a 3 Lts/Ha
	Roseta	Cenchrus pauciflorus	
MAIZ (<i>Zea mays</i> L. RG)	Sorgo de Alepo	<i>Sorghum halepense</i>	1% a 2% en gramilla con mochila
ENTREFILA DE FRUTALES	Gramilla brava	<i>Cynodon dactylon</i>	
	Pasto miel	<i>Paspalum dilatatum</i>	
	Gambarrusa	<i>Alternatera phyloxeroides</i>	
	Correhuela	<i>Convolvulus arvensis</i>	

PREVENCIÓN DE RESISTENCIA:

SE RECOMIENDA ROTAR O COMBINAR CON OTROS HERBICIDAS DE DIFERENTE MECANISMO DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA DE MALEZAS SIN CONTROLAR, INVESTIGANDO LA CAUSA DE SU PERMANENCIA, ELIMINANDOLA PARA QUE NO SE PROPAGUE. **Manchoneo:** Momento(s) de aplicación: para cada combinación: En malezas anuales aplicar en crecimiento activo(4 a 6 hojas). Las malezas perennes son mas susceptibles cuando están en activo crecimiento, cercano a la floración.- Se recomienda su uso en barbecho y labranza cero , sojas genéticamente modificadas y aplicaciones en entrefila en frutales y viñedos sin tocar los troncos verdes y hojas (con pantalla protectora). No pulverizar si se prevenen lluvias. Repetir el tratamiento si llueve antes de las 6 horas de aplicado Número, frecuencia o espaciamiento de aplicaciones, si corresponde: Generalmente se realiza una sola aplicación por temporada.Compatibilidad y fototoxicidad: Con la mayoría de los plaguicidas de uso común que sean de reacción acida. No mezclar con productos de reacción alcalina. En caso de realizar mezclas, diluir los componentes de la misma, por separado, agregándolos al tanque de la maquina con los agitadores en marcha. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, la efectividad agronómica o la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba en pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.Tiempo de espera:

Entre la aplicación y la cosecha deben mediar 14 días. En caso de pastoreo, esperar 21 días luego de la aplicación. En caso de laborear, esperar 5-10 días luego de la aplicación para que se produzca una completa translocación del herbicida.T iempo de reingreso al cultivo: No ingresar al Área tratada hasta que la pulverización hay secado completamente, dejando transcurrir como mínimo 24 horasModo de preparación y técnica de aplicación:

El glifosato disminuye su efectividad cuando es mezclado con agua dura, especialmente con altos contenidos de calcio y magnesio. Por esta razón es importante conocer la calidad del agua a ser utilizada en la mezcla de tanque.

Modo de aplicación: Llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad con agua, agregar la cantidad necesaria de Pampa Gold y completar el llenado con agua.No efectuar el llenado con agua directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. Método de aplicación :Con equipos terrestres. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales



CUIDADO

