

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: PAMPA MAX 90 WDG es un herbicida sistémico no selectivo de post emergencia para controlar malezas anuales y perennes, gramíneas y latifoliadas. Su modo de acción es inhibir a la enzima precursora de la formación de aminoácidos aromáticos, es absorbido por el follaje, trasladándose hacia las raíces, rizomas y órganos subterráneos, provocando la muerte de la maleza. Se degrada rápidamente en contacto con la materia orgánica. El producto se adecua a cero laboreo, laboreo reducido y siembra directa y sobre cultivos genéticamente modificados con resistencia o tolerancia al glifosato.

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS
	Nombre Común	Nombre Científico	
Vid Caña de azúcar Viveros forestales Manzano Peral Ciruelo Duraznero Soja (genéticamente mod.)	Pasto blanco	Digitaria sanguinalis	Malezas anuales— 0,8 a 1,25 Kgs/Ha con menos de 15 cm
	Capin	Echinodoa colona	
	Bracharia	Bracharia platyphylla	
	Yuyo colorado	Amaranthus quitensis	
	Verdolaga	Portulaca oleracea	
	Roseta	Cenchrus pauciflorus	Malezas perennes— —1,65 a 2,50 kgs/Ha
	Sorgo de Alepo	Sorghum ahalepense	
	Gramilla brava	Cynodon dactylon	
	Pasto miel	Paspalum dilatatum	
	Gambarrusa	Alternanthera philoxeroides	
	Correhuela	Convolvulus arvensis	

Prevención de resistencia: se recomienda rotar o combinar con otros herbicidas de diferentes mecanismos de acción, para prevenir la ocurrencia de biotipos resistentes. Se debe observar la presencia de malezas sin controlar, investigando la causa de su permanencia. Elimine las malezas sobrevivientes para evitar su propagación.

Momento de aplicación: Las dosis mayores deberán aplicarse en las malezas muy desarrolladas y en malezas perennes. Se recomienda no aplicar luego de fríos muy intensos y durante época de sequía. Pues la penetración en la planta se puede ver dificultada. Las dosis mayores deberán aplicarse en las malezas muy desarrolladas y en malezas perennes. PAMPA MAX 90 WDG debe ser aplicado sobre malezas emergidas. En los casos en que se aplique sobre cultivos, estos deben ser protegidos o aplicar en forma dirigida evitando tocarlos con la pulverización. En el caso de soja (RR) resistentes a glifosato puede aplicarse sobre el cultivo utilizando las dosis menores, ya que la modificación genética introducida a la soja le otorga resistencia al glifosato. Debe aplicarse con las malezas en activo crecimiento, no debe aplicarse en situaciones de stress de la maleza.

Número, frecuencia o espaciamiento de aplicaciones si corresponde: En caso de tratamiento de malezas perennes, repetir el tratamiento cuando se produzcan rebrotes a los efectos de ir eliminando las malezas gradualmente. PAMPA MAX 90 WDG demora 7 a 10 días en ser trasladado a las raíces, por lo tanto es aconsejable esperar ese lapso antes de hacer cualquier laboreo posterior a la aplicación.

Compatibilidad y fototoxicidad: NO mezclar con herbicidas fenoxiacéticos, ni formulaciones en polvo. Es aconsejable lograr asesoramiento técnico sobre el tipo de mezcla a realizar e cada caso particular. En soja RG debe asesorarse de la resistencia de la variedad que se siembra y en general usar las dosis mas bajas. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

Tiempo de espera: En general no se establece para este producto. En soja genéticamente modificada 14 días. Reingresar los animales para pastoreo 21 días luego el tratamiento.

Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada, hasta que la pulverización haya secado, dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

Modo de aplicación: Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad y luego con los agitadores en marcha agregar la cantidad necesaria de PAMPA MAX 90 WDG y completar el llenado con agua. No efectuar el llenado con agua de las maquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse mediante recipientes intermedios. En caso de usar coadyuvantes agregar por último a no ser que sea para neutralizar aguas duras.

Método de aplicación: Con equipos terrestres o aéreos.

No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos.

No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).

No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

PAMPA MAX

90 WDG

HERBICIDA

Principio Activo	Porcentaje en peso
SAL DE AMONIO DE GLIFOSATO	88,8%
EQUIVALENTE EN GLIFOSATO	80,7%

GRANULADOS SOLUBLES

Grupo químico: DERIVADO DE LA GLICINA

Registro N° 2936

Firma registrante :



SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY

Avda. República de Corea 2962 (Mercado Modelo)

Montevideo - Tels: 2508 6322 - 2508 8866

Fax: 2508 6550 - E-mail: saudu@saudu.com.uy

Web: www.saudu.com.uy

Número de Lote:

Nombre del fabricante: Zhejiang

Jinfanda Biochemical Co,Ltd

Contenido Neto: 25 Kg.

País de origen:

China.

Fecha Vencimiento:

Precauciones y Advertencias:

Clasificación Toxicológica: Clase III (tres). Ligeramente Peligroso IPCS/OMS, 2009.

Antídotos: No tiene antídoto.

Primeros auxilios: En caso de ingestión, provocar el vomito, introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta.

En caso de contacto con la piel. Lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

En caso de contacto con los ojos: Lavado a chorro con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos.

En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.

En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono (2) 1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, o el folleto o el envase.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:

Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.

No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva.

Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto

Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.

No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

No contaminar lagos, ríos u otras fuentes o corrientes de agua con restos de producto.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

Ecotoxicología:

Toxicidad para aves: prácticamente no toxico

Toxicidad para peces: ligeramente toxico. Tomar las precauciones necesarias y suficientes para que ni el producto aplicado ni sus compuestos de degradación lleguen a aguas subterráneas por lixiviación o aguas superficiales por escurrimiento.

Toxicidad para abejas: prácticamente no toxico.

Para que el glifosato se degrade inmediatamente que llegue al suelo tiene que haber no menos de un 2% de materia orgánica.

Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple Lavado" del mismo, volcando el liquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELÉFONO (02) 1722.

CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.

USO AGRÍCOLA.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –SI EXISTE-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

