

Clasificación Toxicológica: CLASE III (tres) – LIGERAMENTE PELIGROSO (IPCS/OMS, 2019)

Antídotos: No tiene antídoto. **Primeros Auxilios:** En caso de ingestión, PROVOCAR el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. En caso de contacto con los ojos, lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua. En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT, TELÉFONO 1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, O EL FOLLETO O EL ENVASE.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber e fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Usar guantes, botas, caretas, antiparras o ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar cerca del viento. Evitar la deriva. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavor cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavor el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos o otras fuentes de agua. No destapar los picos de la pulverizadora o el equipo de aplicación. Evitar el contacto con la piel. Evitar el contacto con la ropa. Evitar que los niños o mascotas o cualquier persona a utilizar durante la preparación y aplicación del producto. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavor el equipo protector luego de cada aplicación.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

Aplicaciones foliares: No producir deriva. Usar técnicas de aplicación que disminuyan la deriva (tipo de boquilla, altura de la barra de aplicación, velocidad de aplicación, volumen de aplicación) y evitar aplicaciones en condiciones climáticas que aumenten las posibilidades de ocurrencia. La empresa aplicadora es la responsable por los daños que se produzcan. No lavar ni vaciar equipos de pulverización en lagos, ríos, otras fuentes de agua o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagües naturales. En caso de derrame durante la aplicación, contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. La protección de los polinizadores y en particular de la abeja es necesaria para la producción sostenible de alimentos y en varios cultivos está asociada a mayores cosechos.

B) PELIGROSIDAD. TOXICIDAD PARA AVES: PRÁCTICAMENTE NO TOXICO. TOXICIDAD PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS: PRÁCTICAMENTE NO TOXICO. TOXICIDAD PARA ABEJAS: VIRTUALMENTE NO TOXICO. TOXICIDAD PARA ORGANISMOS DE SUELO (Lombrices): PRÁCTICAMENTE NO TOXICO.

PARA QUE EL GLIFOSATO SE DEGRAD E INMEDIATAMENTE QUE LLEGUE AL SUELO, EL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA NO DEBE SER INFERIOR A 2%.

Disposición final de envases: una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfure el envase para evitar su reutilización como tal. Traslade los envases con triple lavado al centro de acopio más cercano. Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente sellado con un cartel que indique "Cuidado-veneno (calavera)".

ESTE PRODUCTO CORROE EL HIERRO, GALVANIZADOS O LATA, EMITIENDO GASES EXPLOSIVOS. NO PULVERIZAR NI GUARDAR EN DEPÓSITOS DE ESTE MATERIAL.

"MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES""NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMESTICOS O VESTIMENTAS""EVITAR EL CONTACTO CUTÁNEO CON LA FORMULACIÓN CONCENTRADA O PREPARADA""EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CÍTEL TEL: 1722""CONCURRER AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA O EL FOLLETO O EL ENVASE""NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA""VENTA AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA""USO AGRÍCOLA""PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA""LEA LA ETIQUETA"

PAMPA PREMIUM

HERBICIDA

CONCENTRADO SOLUBLE

Composición del producto:		
Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Porcentaje en peso:	Contenido en volumen:
Glifosato, sal potásica	45,8 %	620 g/L
Equivalente en Glifosato	36,8 %	506 g/L

GRUPO QUÍMICO AL QUE PERTENECE EL INGREDIENTE ACTIVO:
DERIVADO DE LA GLICINA

**PRODUCTO APROBADO POR EL MGAP:
N° REGISTRO 3355**



SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY
Brigadier General Fructuoso Rivera (Ruta 5 km 17500) N° 7451 esq. Altaña, Montevideo
Tel: 2508 6322 Fax: 2508 6322 Int. 130
E-mail: saudu@saudu.com.uy
Web: www.saudu.com.uy

Nº DE LOTE:
FECHA DE FABRICACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
NOMBRE DEL FABRICANTE: ZHEJIANG JINFANDA BIOCHEMICAL CO., LTD
PAIS DE ORIGEN: CHINA

RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:

PAMPA PREMIUM es un herbicida sistémico, post-emergente, no selectivo. Al ser formulado con una sal potásica tiene mejor penetración y circulación por la maleza. Actúa inhibiendo la enzima precursora del ácido pirúvico durante la síntesis de aminoácidos. Se recomienda su uso en barbecho y labranza química, sojas tolerantes y aplicaciones en entrefila de frutales y viñedos.

PREVENCIÓN DE RESISTENCIA:		
COMBINAR CON OTROS HERBICIDAS DE DIFERENTE MECANISMO DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA DE MALEZAS SIN CONTROLAR, ELIMINE LAS MALEZAS SOBREVIVIENTES PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN. Número, frecuencia o espaciamiento de aplicaciones si corresponde. Se puede hacer más de una aplicación por temporada de cultivo si es necesario.		
Compatibilidad y fitotoxicidad: Con la mayoría de los plaguicidas de uso común que sean de reacción ácida. No mezclar con productos de reacción alcalina. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo. Tiempo de espera: En barbecho químico, esperar 7 días para roturar el suelo. Para cosecha de soja 14 días. Para reingreso o pastoreo esperar 21 días. Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado, dejando transcurrir como mínimo 24 horas.		
Modo de preparación y técnica de aplicación:		
Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad y luego con los aditivos en el margen agregando la cantidad necesaria de PAMPA PREMIUM y completar el llenado con agua. Se puede aplicar con equipos terrestres o aéreos. Tamaño de gota mínimo a ser utilizado: 250 micrones de DMV. Dicho valor se ajustará hacia arriba según las condiciones climáticas en el momento de aplicar el producto.		
Cultivo o tipo de aplicación	Malezas controladas	Dosis (L/ha)
	Nombre común	Nombre científico
BARBECHO		Gramíneas Zizania 1,00 - 2,30 L/ha
		Leñitáceas Amorales 2,00 - 3,00 L/ha
		Leñitáceas 1,00 - 3,10 L/ha
		Malezas Euphorbia 3 - 4,5 L/ha
		Gramíneas y Leñitáceas Scirpus y Eleusine 1,00 - 2,30 L/ha
		Malezas Euphorbia 1,00 - 2,30 L/ha
		Aplicar a malezas en activo crecimiento
		No aplicar si hay malezas en estado híbrido (seca).
		Largo de floración post-emergencia esperar 48 horas para hacer la aplicación.
		Aplicar desde la semilla hasta 10 días antes de la siembra 90 L/ha 2,5 L/ha
SOJA (ciclo más de 110 días)	Prato blanco Capote del arce Bracharia Vaino del caracol Verdegrasa Fenoladas Sanguinaria Sergio del napo Gramínea Pasta real Combustión Castañeta Capote anís Capote anís	Digiteira sanguinalis Eleocharis acicularis-pall Bracharia platyphylla Eleusine indica Portulaca oleraceae Polygonum convolvulus Sorghum bicolor Cynodon dactylon Pennisetum polystachion Convolvulus arvensis Cynodon dactylon Eleusine indica
		Gramíneas Zizania 1,00 - 2,30 L/ha
		Aplicar a malezas en activo crecimiento
		No aplicar si hay malezas en estado híbrido (seca).
		Largo de floración post-emergencia esperar 48 horas para hacer la aplicación.
		Aplicar desde la semilla hasta 10 días antes de la siembra 90 L/ha 2,5 L/ha
		Aplicar según la semilla 2,5 L/ha
Faja y roturación NAÑARJA (Ciclo menor a 110 días) (Ciclo menor a 110 días) (Ciclo menor a 110 días) MANGONIA (Ciclo menor de 110 días)	VID (Vitis vinifera) EUCALYPTUS (Eucalyptus globulus Labill. Eucalyptus grandis de Hill de Mitchell)	
CANA DE AZÚCAR (Saccharum officinense L.)		

Resol. s/n de 14/5/2004 y N° 188 DE 25/3/2011:

No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos.

Resol. N°129 de 27/2/2008 -No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares)

No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.



CUIDADO

