

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Clasificación Toxicológica: CLASE III (tres) - LIGERAMENTE PELIGROSO (IPCS/OMS, 2019)

Antídotos: No tiene antídoto. Primeros auxilios: En caso de ingestión, PROVOCAR el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. En caso de contacto con los ojos, lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua. En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT, TELÉFONO 1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, O EL FOLLETO O EL ENVASE.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos

No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto. Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

A) MEDIDAS GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Aplicaciones foliares: No producir deriva. Usar técnicas de aplicación que disminuyan la deriva (tipos de boquilla, altura de la barra de aplicación, velocidad de aplicación, volumen de aplicación) y evitar aplicaciones en condiciones climáticas que aumenten las posibilidades de ocurrencia. La empresa aplicadora es la responsable por los daños que se produzcan. No lavar ni vaciar equipos de pulverización en lagos, ríos , otras fuentes de agua o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagües naturales. En caso de derrame durante la aplicación, contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. La protección de los polinizadores y en particular de la abeja es necesaria para la producción sostenible de alimentos y en varios cultivos está asociada a mayores cosechas.

B) PELIGROSIDAD

TOXICIDAD PARA AVES: PRÁCTICAMENTE NO TOXICO.TOXICIDAD PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS: PRÁCTICAMENTE NO TOXICO. TOXICIDAD PARA ABEJAS: VIRTUALMENTE NO TOXICO. TOXICIDAD PARA ORGANISMOS DE SUELO (Lombrices): PRÁCTICAMENTE NO TOXICO. PARA QUE EL GLIFOSATO SE DEGRADE INMEDIATAMENTE QUE LLEGUE AL SUELO, EL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA NO DEBE SER INFERIOR A 2%.

Disposición final de envases: una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización como tal. Traslade los envases con triple lavado al centro de acopio más cercano.

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno (calavera)".

ESTE PRODUCTO CORROE EL HIERRO, GALVANIZADOS O LATA, EMITIENDO GASES EXPLOSIVOS. NO PULVERIZAR NI GUARDAR EN DEPÓSITOS DE ESTE MATERIAL.



“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES”“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS O VESTIMENTAS”“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TEL: (2) 1722”“EVITAR EL CONTACTO CUTÁNEO CON LA FORMULACIÓN CONCENTRADA O PREPARADA”“CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA O EL FOLLETO O EL ENVASE”“NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”“VENTA AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA”“USO AGRÍCOLA”“PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA”“LEA LA ETIQUETA”

PAMPA

HERBICIDA

CONCENTRADO SOLUBLE

Composición del producto:		
Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Porcentaje en peso:	Contenido en volumen:
Glifosato, sal isopropilamina	41 %	480 g/L
Equivalente en Glifosato	30,8 %	360 g/L

GRUPO QUÍMICO A QUE PERTENECE EL INGREDIENTE ACTIVO: DERIVADO DE LA GLICINA

REGISTRO AUTORIZADO POR EL MGAP: REGISTRO N° 2502



FIRMA REGISTRANTE:

junto al productor

SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY
Brigadier General Fructuoso Rivera (Ruta 5 Km 17500) N° 7451 esq. Altuña. Montevideo

Tels: 2508 6322 Fax: 2508 6322 Int.130
E-mail: saudu@saudu.com.uy
Web: www.saudu.com.uy

N° DE LOTE:

FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

NOMBRE DEL FABRICANTE: ZHEJIANG JINFANDA BIOCHEMICAL CO., LTD

PAIS DE ORIGEN: CHINA

RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:

PAMPA es un herbicida sistémico, post-emergente, no selectivo. Al ser formulado con una sal potásica tiene mejor penetración y circulación por la maleza. Actúa inhibiendo la enzima precursora del ácido pirúvico durante la síntesis de aminoácidos aromáticos. Se recomienda su uso en barbecho y aplicaciones en entre filas de frutales y viñedos.

INSTRUCCIONES DE USO:

Cultivo o sitio de aplicación	Malezas controladas		Dosis (L/ha)	Momento de aplicación
	Nombre común	Nombre científico		
BARBECHO	Pasto blanco Capin del arroz Brachiaria	<i>Digitaria sanguinalis</i> <i>Echinocloa crus-galli</i> <i>Brachiaria platyphylla</i>	Gramíneas Anuales: 1,50 – 2,30 L/ha	Aplicar a malezas en activo crecimiento. No aplicar si hay condiciones de stress hídrico (sequía).
	Yuyo colorado Verdolaga Enredadera Sanguinaria Sorgo de Alepo	<i>Amaranthus quitensis</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Polygonum convolvulus</i> <i>Polygonum aviculare</i> <i>Sorghum halepense</i>	Latifoliadas y Sorgo de Alepo: 1,90 – 3 L/ha	
	Gramilla brava Pasto miel Correhuela Pasto bolita Capin annoni	<i>Cynodon dactylon</i> <i>Paspalum dilatatum</i> <i>Convolvulus arvensis</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Eragrostis plana</i>	Malezas Perennes: 3 – 6 L/ha	
	Filas y entrefilas: NARANJA <i>(Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck) MANZANA <i>(Malus domestica</i> (Suckow) Borkh.) MANDARINA <i>(Citrus reticulata</i> Blanco) POMELO <i>(Citrus grandis</i> (L.) Osbeck) LIMÓN <i>(Citrus x limon</i> (L.) Osbeck) UVA <i>(Vitis vinifera</i> L.) EUCALIPTUS <i>(Eucalyptus globulus</i> Labill.) EUCALIPTUS <i>(Eucalyptus grandis</i> W. Hill ex Maiden)		2,5 – 6 L/ha	

PREVENCIÓN DE RESISTENCIA:

SE RECOMIENDA ROTAR O COMBINAR CON OTROS HERBICIDAS DE DIFERENTE MECANISMOS DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA DE MALEZAS SIN CONTROLAR, ELIMINE LAS MALEZAS SOBREVIVIENTES PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN.

Número, frecuencia o espaciamiento de aplicaciones, si corresponde: Se puede hacer más de una aplicación por temporada de cultivo si es necesario. Compatibilidad y fitotoxicidad: PAMPA no se conseja mezclar con herbicidas fenoxiacéticos, hormonales, ni con formulaciones en polvo, líquidos floables o suspensiones acuosas. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo. Tiempo de espera: Después de aplicar PAMPA y antes de roturar la zona tratada es necesario esperar 7 días en malezas anuales o 10 a 15 días en malezas perennes, de manera que el producto se transporte a todos los órganos. Para pastoreo, entrar los animales transcurridos 21 días desde la aplicación. Tiempo de reingreso mínimo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente, dejando transcurrir como mínimo 24 horas. Modo de preparación y técnica de aplicación: Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad y luego con los agitadores en marcha agregar la cantidad necesaria de PAMPA y completar el llenado con agua. Se puede aplicar con equipos terrestres o aéreos. Tamaño de gota mínimo a ser utilizado: 250 micrones de DMV. Dicho valor se ajustará hacia arriba según las condiciones climáticas en el momento de aplicar el producto.

Resol. s/n de 14/5/2004 y N° 188 DE 25/3/2011:

No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos.

Resol. N°129 de 27/2/2008 -No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares)

No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.



CUIDADO

