PROFIT 25 ME

REGULADOR FISIOLÓGICO

MICRO EMULSIÓN

Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Porcentaje en peso:	Contenido en volumen:
TRINEXAPAC-ETHYL	23.8 %	250 g/l

GRUPO QUÍMICO A QUE PERTENECE EL INGREDIENTE ACTIVO: CICLOHEXADIONA
PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MGAP
Nº REGISTRO: 5087

FIRMA REGISTRANTE:

SAUDU junto al productor

SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY
Brigadier General Fructuoso Riviera (Ruta 5 km 17500) Nº 7451 esq. Altuna. Montevideo
Tels: 2508 6322 - 2508 8866
Fax: 2508 6550 - **E-mail:** saudu@saudu.com.uy
Web: www.saudu.com.uy

Nº DE LOTE:
FECHA DE FABRICACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
NOMBRE DEL FABRICANTE:
PAIS DE ORIGEN: CHINA

Instrucciones de almacenamiento:
Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-Veneno (calavera)".

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Clasificación Toxicológica: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL, IPCS/OMS 2009.
Antídotos: No tiene antídoto.
Primeros auxilios:
En caso de ingestión: NO provocar el vómito.
En caso de contacto con los ojos: lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.
En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado.
Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:
Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.
No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.
Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:
Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.
Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:
Producto poco tóxico para aves y abejas, y ligeramente tóxico para peces.
No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación. Derivas o escurrimientos desde áreas tratadas con este producto hacia fuentes de agua adyacentes podrían resultar peligrosos para peces.
En caso de derrame contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en envases adecuados, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua.
En caso de derrame contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en envases adecuados, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua.
Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722.
CONCURRIR AL MEDICO LLEVADO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.

RECOMENDACIONES DE USO:
Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:
PROFIT 25 ME es un regulador fisiológico que es absorbido principalmente por las hojas, siendo luego translocado hacia las zonas de crecimiento (zonas meristemáticas) dónde inhibe las elongación de los entrenudos.
Específicamente en el cultivo de caña de azúcar fomenta la acumulación de azúcares.

INSTRUCCIONES DE USO:

Cultivo o sitio de aplicación	Dosis Lt/ha	Momento de aplicación
Caña de azúcar	1	Aplicar 20 a 25 días antes de la cosecha prevista.
Observaciones: Aplicar con 0.6 Lt/Ha de aceite Agrícola		

Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones si corresponde:
Se aplica una sola vez, en el momento indicado anteriormente. **Compatibilidad y fitotoxicidad:** PROFIT 25 ME, se aplica solo. No mezclar con ningún otro producto excepto aceite agrícola. No es fitotóxico para el cultivo en la dosis recomendada. **Tiempo de espera:** 25 días. **Tiempo de reingreso al cultivo:** No ingresar al cultivo hasta que haya secado el depósito del producto aplicado, dejando transcurrir como mínimo 24 horas.
Modo de preparación y técnica de aplicación: Llenar con agua el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad y verter la dosis recomendada del producto con los agitadores en marcha, completando luego con el agua restante hasta lograr la concentración deseada. PROFIT 25 ME debe ser aplicado con buenas condiciones de humedad en suelo y con el cultivo en activo crecimiento a los efectos de que se logre una buena translocación del mismo hacia los puntos de crecimiento. Puede ser aplicado con equipos terrestres o aéreos: **Terrestre:** usar equipos de alto volumen. Pastillas abanico cónico que aseguren una perfecta cobertura, según altura y densidad del cultivo. Presión: 40-50 lb/pg2. Agregar Aceite a una concentración de 600 cc/ ha en el caldo total a aplicar.
Velocidad del equipo: no mayor a 8 km/h.
Aérea: Agregar siempre Aceite a razón de 0.6 L/ha, siguiendo las recomendaciones de preparación descriptas. El ancho de trabajo deberá asegurar una adecuada cobertura. Las condiciones óptimas para la aplicación son días soleados, sin vientos y adecuadas condiciones de temperatura y humedad.
Se debe evitar aplicar cuando el viento es menor a 5 km/h (inversión térmica) o mayor a 10 km/h, ya que el potencial de deriva aumenta en estas condiciones. No aplicar cuando se espera la ocurrencia de precipitaciones.
Prohibido llenar con agua las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios.
No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de centros educativos.
Prohibido aplicar con maquinas terrestres autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 m de cualquier corriente natural de agua o fuentes artificiales.
No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).

CUIDADO