

SAU-GIB TABLETAS

REGULADOR DE CRECIMIENTO

TABLETAS SOLUBLES

A) IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Porcentaje en peso:	Contenido en volumen:
ÁCIDO GIBERELICO	10 %	

GRUPO QUÍMICO A QUE PERTENECE EL INGREDIENTE ACTIVO: GIBERELINA

Producto Autorizado por el MGAP -

Número de Registro: 2952

“USO AGRÍCOLA”

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO”



FIRMA REGISTRANTE:

junto al productor

SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY

Brigadier General Fructuoso Rivera (Ruta 5 Km 17500) N° 7451 esq. Altaña. Montevideo

Tels: 2508 6322 Fax: 2508 6322 Int.130

E-mail: saudu@saudu.com.uy

Web: www.saudu.com.uy

Número del lote o partida:

Fecha de fabricación del producto (mes y año):

Tiempo de validez del producto (años): 2 años.

Fecha de vencimiento (mes y año):

Nombre del fabricante: ZHEJIANG QIANJIANG BIOCHEMICAL CO.,LTD

País de origen: CHINA

Nombre y dirección de la firma registrante: SAUDU Ruta 5 y Ruta Perimetral – Montevideo, Uruguay.

Tel.: 25086322

B) RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:

SAU-GIB TABLETAS es una hormona que actúa sobre el crecimiento de las plantas, produciendo cambios morfológicos y fisiológicos. No deja residuos ni posee efecto residual

Instrucciones de uso:

Cultivo	Tabletas C/100 Lts de Agua	Época de aplicación	Resultados
Naranjas	2 a 2,5	Aplicación temprana antes que la fruta comience a cambiar de color(usar 4000 a 5000 lts de agua /Ha Aplicación tardía después que la fruta ha alcanzado su color comercial, aprox. un mes antes de la recolección	Demora la sobre maduración de la cascara evitando problemas como mancha de agua, superficie pegajosa, cáscara blanda y rotura bajo presión. Logra una cosecha más uniforme
Limones, Pomelos	1 a 2	Aplicar antes que la fruta cambie de color verde a amarillo (Mayo/Junio). Usar 5000 lts/ha.	Disminuye la cantidad de frutos maduros de pequeño tamaño, retrasa la maduración y logra una producción más uniforme
Mandarinas	4 a 5	Aplicar en Abril/Junio, utilizar 5000 lts /Ha	Disminuye la caída de los frutos, retrasa la época de cosecha y se obtiene una producción más pareja
Perales	2	Dentro de las 48 horas posteriores a la helada, mojado bien todo el árbol	Induce la formulación de frutos sin semilla (partenocarpicos). Luego que las plantas en floración fueron afectadas por una helada
Papa para semilla	1—para papa cortada 2-para papa semillas	Antes de la plantación sumergir las papas semilla en la solución durante 15 minutos	Interrumpe el letargo o lactancia y produce mayor vigor en la brotación y crecimiento
Melón, Pepino y Sandía	1,5 a 2 4 a 5	Cuando aparezca el 50% de la floración Dirigir la aplicación directamente al fruto, 14 días antes de la cosecha	Uniforme la floración y formación de frutos. Aumenta el tamaño del fruto. Facilita el manejo y transporte de la fruta durante la cosecha
Uva con semilla	1	Aplicar sobre racimos de 4-5 cm de largo	Alarga y abre los racimos, permitiendo una mayor ventilación, evitando el moho gris

Momento(s) de aplicación:

Ver cuadro.

Frecuencia, número o espaciamiento de las aplicaciones, si corresponde: Ver cuadro.

Compatibilidad y fitotoxicidad:

Con la mayoría de los plaguicidas de uso común que sean de reacción ácida. No mezclar con productos de reacción alcalina. En caso de realizar mezclas, diluir los componentes de la misma por separado, agregándolos al tanque de la maquina con los agitadores en marcha.

Tiempo de espera:

No tiene.

Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al cultivo hasta que haya secado el depósito del producto aplicado, dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

Otras informaciones NECESARIAS respecto al uso: No dejar el caldo preparado más de 12 horas

No aplicar en Naranja Valencia

Modo de preparación y técnica de aplicación:

Disuelva la tableta en 1/2 a 1 Lt. de agua con agitación constante. Luego vierta la dilución en el volumen de agua a usar. Las soluciones en agua son inestables, deben prepararse inmediatamente antes de usar. Aplicar con equipos convencionales.

C) PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Clasificación Toxicológica Aguda: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL. IPCS/OMS, 2009.

Antídotos: No tiene antídoto.

Primeros auxilios:

En caso de ingestión: No provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos: lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:

Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

Producto poco tóxico para aves, peces y abejas. No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación. Derivas o escurrimientos desde áreas tratadas con este producto hacia fuentes de agua adyacentes podrían resultar peligrosos para peces. En caso de derrame contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en envases adecuados, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua.

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase haga el “Triple lavado” del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perforo el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.



“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”. “EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722”. “CONCURREIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE”. “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”. “NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”. “PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA”



CUIDADO

