

## FUNGICIDA

**REGISTRO N° 3582**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**  
**Clasificación Toxicológica:** POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL,  
 IPCS/OMS 2009.  
**Antídotos:** No tiene antídoto.

**Primeros auxilios:**  
 En caso de ingestión: NO provocar el vómito.  
 En caso de contacto con los ojos: lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.  
 En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.  
 En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado.

**Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:**  
Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.  
No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.  
No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.  
No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.  
Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

**Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:**  
 Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.  
 Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

**Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:**  
Producto ligeramente tóxico para aves y abejas, y muy tóxico para peces. No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación. Derivas o escurrimientos desde áreas tratadas con este producto hacia fuentes de agua adyacentes podrían resultar peligrosos para peces.  
No utilizar para almacenar y absorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en envases adecuados, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua.

**Disposición final de envases:** Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perforo el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”  
 “EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEF: (2)1722”  
 “CONCURREIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE”  
 “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”  
 “NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”  
 Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca  
 “USO AGRICOLA”  
 “LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
 “PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.”

Número de Lote:  
Fecha Vencimiento:  
País de origen: China.  
Nombre del fabricante:

**Instrucciones de almacenamiento:** Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-Veneno (calavera)".

**Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:** SPONSOR 50 WG es un fungicida del grupo de las estrobilurinas, con acción de contacto, preventivo, curativo y erradicante, dependiendo del patógeno y del momento de la aplicación. Actúa sobre las esporas y la esporulación. Se recomienda seguir las advertencias de los servicios de alarma especialmente en sarna del manzano donde tiene post infección de 72 hs.

**Instrucciones de uso:**

| Cultivo                                                                                                                                   | Enfermedad   |                         | Dosis       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|
|                                                                                                                                           | Nombre Común | Nombre Científico       |             |
| MANZANA Y PERA                                                                                                                            | Sarna        | <i>Venturia sp.</i>     | 200 gr./ha. |
| Realizar 3 aplicaciones sucesivas a partir de punta verde cada 10 - 12 días. No aplicar más allá de la primera pulverización de cubierta. |              |                         |             |
| En sarna poseer una acción post-infección o efecto retroactivo o erradicante de 72 horas.                                                 |              |                         |             |
| VID                                                                                                                                       | Oidio        | <i>Uncinula necator</i> | 200 gr./ha  |
| Realizar 3 aplicaciones sucesivas en floración repitiendo cada 10 - 15 días.                                                              |              |                         |             |

**Momento(s) de aplicación:** Ver cuadro.

**Compatibilidad y fitotoxicidad:** Cuando no se conozca la compatibilidad o fitocompatibilidad con otros fitosanitarios, antes de la aplicación efectuar una prueba en pequeña escala con los productos que se combinará para conocer la compatibilidad y la fito compatibilidad.

**Tiempo de espera:** Para todos los cultivos: 35 días.

**Tiempo de reingreso al cultivo:** No ingresar al cultivo hasta que haya secado el depósito del producto aplicado, dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

**Otras informaciones NECESARIAS respecto al uso:**

Cuando fungicidas de un mismo modo de acción, son usados repetidamente en las mismas zonas, puede producirse la aparición de biotipos resistentes, que logran sobrevivir, propagarse y/o volverse dominantes en dicha zona. Se recomienda el uso de fungicidas con diferente modo de acción en forma alternada o en mezcla, evitan o demoran el desarrollo de la resistencia.

**Modo de preparación y técnica de aplicación:** Cargar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad de su capacidad. Con el equipo agitador en marcha agregar la cantidad requerida de SPONSOR 50 WG y mezclar bien. Se han de aplicar otros fitosanitarios, prepararlos y mezclarlos bien antes de agregar el SPONSOR 50 WG. Mantener el equipo agitador en continuo movimiento durante la preparación y hasta finalizar la aplicación. SPONSOR 50 WG se aplica con los equipos de uso frecuente, pulverizadores o atomizadores, manuales o de tractor, siempre con agitadores, de alto o bajo volumen, siempre y cuando se asegure una cobertura adecuada del cultivo a tratar. Las dosis por 100 Lt especificadas para aplicación directa al cultivo se refieren a dosis del producto para aplicaciones en alto volumen. Cuando se empleen equipos aplicadores de bajo volumen se deberá calibrar el equipo de aplicación para mantener la misma cantidad de producto comercial por unidad de superficie. Prohibido llenar con agua las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de centros educativos.

Prohibido aplicar con máquinas terrestres autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 m de cualquier corriente natural de agua o fuentes artificiales.

No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de cualquier natural de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (laos, lagunas, represas y tñaimares).



## FUNGICIDA

**REGISTRO N° 3582**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**  
**Clasificación Toxicológica:** Poco peligroso en el uso normal.  
 (IPCS/OMS 2006).

**Antídotos:** no tiene

**Primeros Auxilios:** En caso de ingestión no provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos lavar a chorro con agua limpia abundante durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados separados. Contacto con la piel lavar de las partes afectadas con abundante agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volverlas a usar. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado".

**Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:** Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

**Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:** Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

No contaminar fuentes de agua corrientes ni agregar con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.

Producto ligeramente tóxico para aves y abejas y muy tóxico para peces. No aplicar en forma terrestre a menos de 10 metros de distancia de lagunas, ríos, represas u otras fuentes de agua. Derivas o escurrimientos desde áreas tratadas con este producto hacia fuentes de agua adyacentes podrían resultar peligrosas para peces. En caso de derrame contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; enterrar el material impregnado en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua.

**Disposición final de envases:** Evite la reutilización del envase. Guarde el sobrante de producto en su envase original, cerrado, debidamente etiquetado, en lugar seguro y fresco.  
Una vez vaciado el contenido de los envases almacénelos en un contenedor apropiado para su envío al Centro de Acopio mas cercano.

☐ MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS ☐.

**EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722**

☐ CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE ☐.

❑ NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS ❑.

☐ NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA ☐.

Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

☐ **USO AGRICOLA** ☐

**□ LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO □ si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO □.**

Número de Lote:  
Fecha Vencimiento:  
País de origen: China.  
Nombre del fabricante:

**Instrucciones de almacenamiento:** Mantener el producto en sus envases originales bien cerrados, almacenados en locales seguros, ventilados, al resguardo de la luz solar y alejado de alimentos, otros plaguicidas, semillas, forrajes o fertilizantes. No trasvasar a otros envases.

**Generalidades e instrucciones para su uso:** **Sponsor 50 WG** es un fungicida del grupo de las estrobilurinas, con acción de contacto, preventivo, curativo y erradicante, dependiendo del patógeno y del momento de la aplicación. Actúa sobre las esporas y la esporulación se recomienda seguir las advertencias de los servicios de alarma especialmente en sarna del manzano donde tiene post infección de 72 hs

| Cultivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Enfermedad   |                   | Dosis       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nombre Común | Nombre Científico |             |
| MANZANA Y PERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sarna        | Venturia sp.      | 200 gr./ha. |
| <p>Realizar 3 aplicaciones sucesivas a partir de punta verde cada 10 - 12 días. No aplicar más allá de la primera pulverización de cubierta.</p> <p>En sarna posee una acción post-infección o efecto retroactivo o erradicante de 72 horas.</p> <p><u>Referencias de uso. Documentos de la empresa en carpeta de registro.</u></p> |              |                   |             |
| VID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oídio        | Uncinula necator  | 200 gr./ha  |
| <p>Realizar 3 aplicaciones sucesivas en floración repitiendo cada 10 - 15 días.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                   |             |

**Compatibilidad y Fitotoxicidad:** Cuando no se conozca la compatibilidad o fitocompatibilidad con otros fitosanitarios, antes de la aplicación efectuar una prueba en pequeña escala con los productos que se combinará para conocer la compatibilidad y la fitotoxicidad.

**Tiempo de espera:** 35 días  
**Tiempo de reingreso al cultivo:** No entrar al cultivo hasta que haya secado el depósito del producto aplicado.  
**Otras informaciones necesarias respecto al uso:** Para prevenir la generación de resistencia alternar o combinar la aplicación de este producto con fungicidas de diferente modo de acción o limitar el número de aplicaciones a no más de 2 a 3 aplicaciones por temporada.

**Modo de preparación y técnica de aplicación:** Preparar una premezcla en agua con la cantidad necesaria de **SPONSOR 50 WG** y los productos fitosanitarios con los que se vaya a combinar. Revolver hasta lograr una premezcla homogénea. Llenar el tanque del equipo de aplicación con agua hasta la mitad de su capacidad. Con el sistema de agitación en funcionamiento agregar lentamente la premezcla. Completar el llenado de tanque con la cantidad de agua necesaria manteniendo el agitador o retorno en funcionamiento hasta lograr un caldo homogéneo. El producto preparado debe ser utilizado antes de las 24 horas. Si queda en reposo durante varias horas, es necesario hacer funcionar el agitador o retorno durante algunos minutos, antes de recomenzar la aplicación. Puede aplicarse con cualquier equipo de pulverización o atomización, de alto o bajo volumen, terrestre o aéreo dependiendo del cultivo que se trate, siempre y cuando se utilice una técnica de aplicación que asegure una cobertura adecuada del cultivo a tratar. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 mt. de cualquier zona urbana sub urbana y centro poblado. Prohibido aplicar en forma aérea en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 30 mt. de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes de agua superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). Prohibida la aplicación aérea en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 50 mt del límite del predio de escuelas rurales. No realizar aplicaciones aéreas en cultivos sensibles (frutales, hortalizas, cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. Prohibido aplicar con maquinas terrestres autopulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 mt de cualquier corriente natural de agua. Prohibida la aplicación terrestre mecanizada en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 30 mt del límite del predio de escuelas rurales. Prohibido llenar con agua las maquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedarios.

