

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Clasificación Toxicológica: Categoría II (dos).
Antídotos: No tiene realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios: En caso de ingestión provocar el vomito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta.
En caso de contacto con la piel. Lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
En caso de contacto con los ojos: Lavado a chorro con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos.
En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:
Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.
No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva.
Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.
Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto
Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.
No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.
No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.
No contaminar lagos, ríos u otras fuentes o corrientes de agua con restos de producto.
Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple Lavado" del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:
Toxicidad para abejas: Moderadamente toxico.
Toxicidad para aves: Prácticamente no toxico.
Toxicidad para peces: Muy toxico.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELÉFONO (02) 1722.
CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.
USO AGRÍCOLA.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO -SI EXISTE-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

HERBICIDA

CHANA

Principio Activo	Porcentaje en peso	Concentración en volumen
ACETOCLOR	80,8 %	900grs/lt

CONCENTRADO EMULSIONABLE

GRUPO QUÍMICO: CLOROACETANILIDA

Instrucciones de almacenamiento:
Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia que diga "Cuidado-Veneno" (con símbolo de calavera)".

Firma registrante :



SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY

Avda. República de Corea 2962 (Mercado Modelo)
Montevideo - Tels: 2508 6322 - 2508 8866
Fax: 2508 6550 - **E-mail:** saudu@saudu.com.uy
Web: www.saudu.com.uy

Registro N° 2693

N° Lote: Fabricante:Shandong Binnong Technology Co.Ltd.
Vencimiento:
Contenido Neto:20 lt. País de Origen:

Generalidades e instrucciones para su uso: CHANA, es un herbicida recomendado para el control de gramíneas y hoja ancha en preemergencia.
Por su modo de acción CHANA es absorbido por los órganos aéreos jóvenes de las malezas antes de la emergencia.

CULTIVO	MALEZAS	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
MAIZ GIRASOL	Albahaca silvestre	Galisoja parviflora
	Bracharia	Bracharia platyphilla
	Capin	Echinocloa crusgalli
	Cola de zorro	Setaria viridis
	Chinchilla	Tagetes minuta
	Eleusine	Eleusine indica
	Panicum	Panicum dichotomiflorum
	Pasto blanco	Digitaria sanguinalis
	Quinoa	Chenopodium album
	Sorgo de alepo	Sorgum halepense(de semilla)
	Verdolaga	Portulaca oleracea
	Yuyo colorado	Amaranthus reflexus

DOSIS:
Suelos livianos—1,5 a 2,5 lts/Ha
Suelos Medios—2,5 a 3,0 Lts/Ha
Suelos pesados—3,0 a3,8 Lts/Ha

Época y momento de aplicación: Chana debe ser aplicado inmediatamente después de la siembra. Se debe tener en cuenta que el suelo este bien preparado (sin terrones), libre de malezas, y restos de rastrojo. Tener en cuenta que para una buena eficacia del producto, debe haber humedad suficiente en el suelo.
Compatibilidad y fototoxicidad: Puede mezclarse con Atrazina para mejorar el espectro de control de malezas.

Modo de aplicación: Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad y luego con los agitadores en marcha agregar la cantidad necesaria de Chana y completar el llenado con agua.
No efectuar el llenado con agua de las maquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse mediante recipientes intermedios.

Método de aplicación: Con equipos terrestres o aéreos.
No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 500 mts de cualquier zona urbana o suburbana y centros poblados ni inferior a 30 mts de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). Ni inferior a 30 mts de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). Ni a menos de 500 mts del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales oleaginosas y forrajeros) a una distancia inferior a 300 mts de cualquier zona urbana o suburbana y centros poblados. No realizar aplicaciones terrestres con maquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 10 mts de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No realizar aplicaciones terrestres con maquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 mts de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No efectuar el llenado con agua de las maquinas de aplicación o directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales. El mismo deberá realizarse siempre utilizando recipientes intermedios". Ni inferior a 300 mts del límite del predio de centros educativos.

Tiempo de reingreso mínimo: No ingresar al área tratada, hasta que la pulverización haya secado, dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

