

FULL SOJA 480 SC

HERBICIDA

Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Porcentaje en peso:	Contenido en volumen:
FLUMIOXAZIN	55.5 %	480 G/L

GRUPO QUIMICO: CICLOHEXENODICARBOXIMIDA SUSPENSIÓN CONCENTRADO

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno (calavera)"

Firma registrante :



junto al productor

SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY

Avda. República de Corea 2962 (Mercado Modelo)

Montevideo - Tels: 2508 6322 - 2508 8866

Fax: 2508 6550 - E-mail: saudu@saudu.com.uy

Web: www.saudu.com.uy

Registro N° 4993

Número de Lote:

Nombre del fabricante:

Agrohao Company Ltd.

Contenido Neto: 5 Lts.

Fecha Vencimiento:

País de origen: China.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Clasificación Toxicológica: CLASE III (TRES) LIGERAMENTE PELIGROSO IPCS/OMS, 2009.

Antídotos: No tiene antídoto.

Primeros auxilios: En caso de ingestión, no provocar el vómito. Tratamiento sintomático. En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua. Contacto con los ojos, lavar con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación, retirar a la persona contaminada a un lugar bien ventilado.

En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono 1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, o el folleto o el envase.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.

No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva.

Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del

cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.

Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.

No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:

Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

Toxicidad para abejas: Virtualmente tóxico.

Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.

Toxicidad para peces: Ligeramente tóxico.

"Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto

aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas,

organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".

"EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722".

"CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE".

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".

"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".

Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

"USO AGRICOLA"

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO -si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO".

Generalidades de uso: Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: Full Soja 480 SC es un herbicida selectivo de pre siembra. Puede ser aplicado en pre-emergencia y post-emergencia temprana de las malezas. Es del grupo Feniltalimida que actúa por inhibición de la enzima protoporfirinógeno-IX-oxidasa (inhibidores de Protox o PPO) que actúa en la oxidación de la protoporfirina IX (precursora de la clorofila), provocando una ruptura celular y rápida desecación de las malezas al emerger y entrar en contacto con la luz solar.

Instrucciones de uso:

Cultivo o sitio de aplicación	Malezas		Dosis (cc/ha)	Observaciones
	Nombre Común	Nombre Científico		
SOJA	Yerba carnícora Yuyo colorado	Coniza bonariensis Amaranthus palmeri	50 - 150	En pre-emergencia de las malezas establecidas. No aplicar cuando la masa vegetal impida su llegada al suelo. Utilizar las dosis menores cuando las malezas son más pequeñas y con condiciones de crecimiento muy favorables.

Prevención de resistencia: Se recomienda rotar con otros herbicidas de diferente mecanismos de acción, para prevenir la ocurrencia de biotipos resistentes. Se debe observar la presencia de malezas sin controlar, investigando la causa de su permanencia. Elimine las malezas sobrevivientes para evitar su propagación.

Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones si corresponde: Se aplica una sola vez, en el momento indicado anteriormente.

Compatibilidad y fitotoxicidad: Full-Soja es compatible con la mayoría de los fitosanitarios usados tradicionalmente. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

Tiempo de espera: Tiempo de espera en Soja entre aplicación y cosecha: No corresponde por su momento de aplicación.

Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

Modo de preparación: Llenar con agua el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad y verter la dosis recomendada del producto con los agitadores en marcha, completando luego con el agua restante hasta lograr la concentración deseada.

No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde

corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.

Método de aplicación: Full-Soja debe ser aplicado con buenas condiciones de humedad en suelo y con la maleza en activo crecimiento a los efectos de que se logre una buena translocación del mismo hacia los puntos de crecimiento. Puede ser aplicado con equipos terrestres o aéreos:

Terrestre: usar equipos de alto volumen. Pastillas abanico plano que aseguren una perfecta cobertura, según altura y densidad de la maleza.

Presión: 40-50 lb/pg2. Agregar Aceite a una concentración del 1 % del caldo total a aplicar (1 L/100 L de agua)

Velocidad del equipo: no mayor a 8 km/h.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos.

No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

Aéreo: Agregar siempre Aceite a razón de 2-2,5 L/ha, siguiendo las recomendaciones de preparación descriptas. El ancho de trabajo deberá asegurar una adecuada cobertura.

-Las condiciones óptimas para la aplicación son días soleados, sin vientos y adecuadas condiciones de temperatura y humedad.

-Se debe evitar aplicar cuando el viento es menor a 5 km/h (inversión térmica) o mayor a 10 km/h, ya que el potencial de deriva aumenta en estas condiciones.

-No aplicar cuando se espera la ocurrencia de precipitaciones.

No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos.

-No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).

