

Clasificación Toxicológica: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL IPCS/OMS,2006.

Antídotos: No tiene antídoto.

Primeros auxilios: En caso de ingestión NO provocar el vómito. En caso de contacto con la piel, lavado de las partes afectadas con agua abundante y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarlas antes de volverlas a usar. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TEL: 02-1722 CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:
Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.
No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva.
Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.
Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.
Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.
No desatapar los picos de la pulverizadora con la boca.
No contaminar lagos, ríos u otras fuentes o corrientes de agua con restos de producto.
Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple Lavado" del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:
ABEJAS: Virtualmente No tóxico.
PECES: Ligeramente Tóxico.
AVES: Moderadamente tóxico

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPER-TAS".
"EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEFONO?(02) 1722".
"CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE".
"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".
"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".
Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
"USO AGRICOLA"
"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO".

LOROX 500 S.C

HERBICIDA

Principio Activo	Porcentaje en peso	Porcentaje en volumen
LINURON	45,45%	500 g/lit

SUSPENSIÓN CONCENTRADA

GRUPO QUÍMICO: DERIVADO DE LA UREA

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia que diga "Cuidado-Veneno" (con símbolo de calavera).

Firma registrante :



SAUDU junto al productor

SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY

Avda. República de Corea 2962 (Mercado Modelo)
Montevideo - Tels: 2508 6322 - 2508 8866
Fax: 2508 6550 - **E-mail:** saudu@saudu.com.uy
Web: www.saudu.com.uy

Registro N° 3555

Número de lote: Nombre del fabricante:
Contenido Neto: País de origen:
Fecha de Vencimiento: País de origen:

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: Instrucciones de uso: LOROX 500 S.C. es un compuesto derivado de la urea, inhibiendo el transporte de electrones en la fotosíntesis usado en aplicación pre y post-emergente. LOROX 500 S.C controla numerosas especies gramíneas y de hoja ancha. Es un herbicida indicado para diversos cultivos hortícolas, rápidamente absorbido a través de las raíces y algo también a través del follaje.

CULTIVO	MALEZA		DOSIS Y MOMENTO DE APLICACIÓN
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
AJO CEBOLLA PEREJIL POROTO PUERRO ZANAHORIA	Altamisa	Ambrosia tenuifolia	Perejil y Zanahoria - 1,5 a 2,0 Lts /Ha Pre y post-emergente. Luego de que la zanahoria tengo 3 hojas verdaderas. En Perejil después del corte.
	Cepa caballo	Xanthium spinosum	
	Manzanilla	Matricaria chamomilla	
	Cola de zorro	Setaria spp	Cebolla y Puerro - 0,75 a 1,5 Lts/Ha Post Trasplante (2 semanas después del trasplante)
	Nabo	Brassica rapa	
	Mostacilla	Sinapsis arvensis	
	Quinoa	Chenopodium spp	Ajo y Poroto - 1,0 a 2,0 Lts/ha Pre emergencia. Enseguida de plantar
	Sanguinaria	Polygonum aviculare	
	Senecio	Senecio vulgaris	
	Verdolaga	Portulaca oleracea	
	Yuyo colorado	Amaranthus spp	
	Capin	Echinochloa crusgalli	
	Pasto blanco	Digitaria sanguinalis	
	Pasto de invierno	Poa annua	

Compatibilidad y fototoxicidad: Con la mayoría de los plaguicidas de uso común que sean de reacción ácida. No mezclar con productos de reacción alcalina. En caso de realizar mezclas, diluir los componentes de la misma por separado, agregándolos al tanque de la máquina con los agitadores en marcha. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.
Prevención de Resistencia: Se recomienda rotar o combinar con otros herbicidas de diferente modo de acción, para prevenir la ocurrencia de biotipos resistentes. se debe observar la presencia de malezas sin controlar, investigando la causa de su permanencia, eliminándola para que no se propague.
Modo de aplicación: Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad y luego con los agitadores en marcha agregar la cantidad necesaria de y completar el llenado con agua. No efectuar el llenado con agua de las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse mediante recipientes intermedios.
Método de aplicación: Con equipos terrestres o aéreos. Puede aplicarse con equipos comunes de barra y picos para herbicidas de abanico plano, con una presión de 30 a 50 lbs/pulg2, calibrando la máquina para un gasto de agua de 100 a 150 lts/ha. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 500 mts de cualquier zona urbana o suburbana y centros poblados. Ni inferior a 30 mts de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). Ni a menos de 50 mts del límite del predio de escuelas rurales. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales oleaginosas y forrajeros) a una distancia inferior a 300 mts de cualquier zona urbana o suburbana y centros poblados; No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 10 mts de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales: Prohibida la aplicación aérea en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 50 metros del límite del predio de escuelas rurales. Prohibida la aplicación terrestre mecanizada en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 30 metros del límite del predio de escuelas rurales.

Tiempo de reingreso mínimo: No ingresar al área tratada, hasta que la pulverización haya secado, dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

