

Clasificación Toxicológica: Clase III (tres) Ligeramente peligroso IPCS/OMS 2009.

Antídotos: No tiene.

Primeros auxilios: En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico. Concurrir al médico con el envase y/o la etiqueta.

En caso de ingestión NO provocar el vomito.

En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Lavar la ropa antes de volverla a usar.

En caso de contacto con los ojos, lavado con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados.

En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono 2 1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, o el folleto o el envase.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y ojos.

No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto.

Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.

No destapar los picos pulverizadores con la boca.

Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.

No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto.

Guardar el producto en su envase original, etiquetado, en lugar fresco y seco, evitando la luz directa del sol.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. Evitar la deriva.

No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos de producto.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

Toxicidad para aves: PRACTICAMENTE NO TOXICO

Toxicidad para peces: MODERADAMENTE TOXICO “Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar.”

Toxicidad para abejas: LIGERAMENTE TOXICO Se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de aplicación por lo menos a cuatro kilómetros del límite tratado y por un tiempo mínimo de treinta días. Dar aviso a los apicultores cercanos antes de la aplicación. En caso de no poder trasladar las colmenas, no realizar aplicaciones en el horario del pecoreo de las abejas. Taparlas con apillera o espuma de goma húmeda durante la aplicación. Hacer aplicaciones nocturnas o por la mañana temprano.

Una vez vaciado el contenido del envase haga el “Triple lavado” del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora, luego perfere el envase para evitar su reutilización

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722.

CONCURRRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.

USO AGRÍCOLA.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –SI EXISTE-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

SHERIFF

HERBICIDA

Principio Activo	Porcentaje en peso	Contenido en Volúmen
HALOXYFOP - P - metil	10,8 %	108 gr/lt

CONCENTRADO EMULSIONABLE

GRUPO QUÍMICO: ARILOXIFENOXI PROPIONICO

Instrucciones de almacenamiento: PRODUCTO INFLAMABLE -Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias toxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia que diga “Cuidado-Veneno” (con símbolo de calavera).

Firma registrante :



junto al productor

SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY

Avda. República de Corea 2962 (Mercado Modelo)

Montevideo - Tels: 2508 6322 - 2508 8866

Fax: 2508 6550 - E-mail: saudu@saudu.com.uy

Web: www.saudu.com.uy

Registro N° 3498

Número de lote:	Nombre del fabricante: Nanjing huazhou
Contenido Neto:	Pharmaceutical Co.Ltd
Fecha de Vencimiento:	País de origen: CHINA

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: Sheriff es un herbicida post emergente de acción sistémica, selectiva para el control de malezas gramíneas anuales y perennes. Sheriff detiene el crecimiento de la maleza inmediatamente de aplicado, su modo de accione inhibir la acetil CoA precursora de la síntesis de lípidos. La maleza tratada con el herbicida Sheriff, muestra un cambio progresivo de coloración en las hojas, tomando estas coloraciones violáceas, amarillas y finalmente marrones. Posee alta capacidad de penetración a través del follaje de las malezas y una rápida traslocación hacia los puntos de crecimiento como yemas, rizomas y raíces.

Cultivo	Maleza		Dosis /Lts Ha	
	Nombre Común	Nombre Científico		
Girasol, Soja, Lotus, Treboles, Alfalfa, Vid, Manzano	Gramilla brava	Cynodon dactylon	0,5- 0,75	Con estolones de 10 a 20 cm
			1,25 a 1,50	Con Cynodon ya establecido
Perales, Durazno, Citrus, Papa, Boniato, Tomate, Pimiento,Lechuga	Pasto miel	Paspalum dilatatum	0,5 a 0,75	
Haba, Poroto, Arveja, Forestales	Sorgo de alepo	Sorghum halepense		
Arándanos	Pasto blanco Capin	Digitaria sanguinalis	0,35 a0,50	De 2 a 4 hojas hasta macollaje
	Avena guacha Raigras	Echinochloa colona Avena fatua Lolium multiflorum		

Prevención de Resistencia: Se recomienda rotar o combinar con otros herbicidas de diferentes mecanismos de acción, para prevenir la ocurrencia de biotipos resistentes. Se debe observar la presencia de malezas sin controlar, investigando la causa de su permanencia. Elimine las malezas sobrevivientes para evitar su propagación.

Momento(s) de aplicación: para cada combinación: Sobre Sorgo de alepo los mejores resultados se obtienen con plantas de entre 20 a 40 cm de altura, creciendo activamente con humedad en el suelo. En Gramilla, realizar la aplicación antes de la floración, en activo crecimiento de la maleza. No aplicar sobre colchones envejecidos de gramilla, o con falta de humedad en el suelo o síntomas de marchitez.

Compatibilidad y fototoxicidad: Es compatible con los herbicidas de uso común. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

Tiempo de espera: Pastoreo o corte de forraje en lotus, tréboles o alfalfa - 7 días. Girasol, Soja, vid, frutales, olivo, tomate - 28 días.

Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización hay secado completamente, dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

Modo de preparación y técnica de aplicación:

Método de aplicación: Con equipos terrestres o aéreos. En verano se recomienda el uso de aceite vegetales dosis de 1,5 a 2 ,0 lts/ha para evitarla evaporación y facilitar la penetración en los tejidos vegetales

Modo de aplicación: Llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad con agua ,agregar la cantidad necesaria de Sheriff y completar el llenado con agua.

No efectuar el llenado con agua directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.

No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos.

No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).

No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

