RETADOR

HERBICIDA

GRUPO QUÍMICO: URACILO
SUSPENCIÓN CONCENTRADA

Principio Activo	Porcentaje en peso
LENACIL	80 %

Registro N° **3327**

Precauciones, indicación de veneno y antídotos: No tiene antídoto.
Escala de toxicidad: Poco peligroso en el uso normal (IPCS/OMS) – 2004
Categoria: III
Medidas a tomar como primeros auxilios:
En caso de ingestión, NO provocar el vómito.
En caso de contacto con la piel, lavar la piel con abundante agua o agua jabón.
Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volverla a usar.
En caso de contacto con los ojos. Lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados.
En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.
Consultar al C.I.A.T. (Hospital de Clínicas, 7º piso) Teléfono 1722
En caso de intoxicación llamar al **CIAT, teléfono (02) 1722** y concurrir llevando la etiqueta, o el folleto o el envase.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros, e instrucciones de manejo de envases:
Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.
No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva.
Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.
Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.
Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.
No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.
No contaminar lagos, ríos u otras fuentes de agua o corrientes de agua con restos del producto.
Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización como tal.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES.
NO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMESTICOS O VESTIMENTAS.
PROHIBIDO SU USO DISTINTO A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.
LEA LA ETIQUETA
VENTA AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.
USO AGRÍCOLA

Advertencia sobre protección del medio ambiente y toxicidad para aves, peces y abejas:
Toxicidad para aves: PRACTICAMENTE NO TOXICO
Toxicidad para peces: LIGERAMENTE TOXICO
Toxicidad para abejas: LIGERAMENTE TOXICO

NOTA: La firma registrante garantiza la calidad de este producto. Como su uso, manejo y almacenamiento se realizan fuera del control de nuestra firma, esta no se hace responsable por daños y perjuicios que puedan derivarse del empleo o almacenamiento de este material, quedando por entendido que el comprador ha aceptado estas condiciones.

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo y estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia.

Generalidades e instrucciones para su uso: Retador es un herbicida de pre-emergencia indicado para el control de malezas gramíneas y de hojas ancha en cultivos hortícola de hoja (acelga, espinaca), remolacha y frutilla.

Cultivo	Maleza	
	Nombre común	Nombre Científico
Acelga Espinaca Frutilla Remolacha	Cola de zorro Pasto cuaresma Cebadilla Raigras Rabano Capiqui Nabo silvestre Abrepuño Quinoa Lengua de vaca LLanten Diente de león Senecio Gramilla brava Bolsa de pastor	Setaria Geniculata Digitaria Sanguinalis Bromus Unioloides Lolium Multiflorum Raphanus Sativus Stellaria Media Brassica Campestris Centaurea Calcitrapa Chenopodium Album Rumex Spp Plantago Lanceolata Taraxacum Officinale Senecio Burchelli Cynadon Dactylon Capsela Bursa-Pastoris

Épocas de aplicación: Acelga, espinaca y remolacha: inmediatamente luego de la siembra. Frutilla: luego del trasplante, antes de floración o después de la cosecha sobre el suelo libre de malezas.

Contraindicaciones: En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fototoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo. Es compatible con los herbicidas de uso común.

Frecuencia de las aplicaciones: Una sola aplicación es necesaria y tener en cuenta que el producto se mantiene por 4 meses en el suelo, por lo cual no se puede plantar otro cultivo que no sea tolerante a este producto.

Tiempo de espera: Remolacha 30 días; Espinaca y Acelga no corresponde.

Modo de aplicación: Llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad con agua. Separadamente efectuar una premezclada con la cantidad necesaria de Retador a ser aplicada y agregar esta pasta al tanque de la máquina y completar el llenado con agua con los agitadores en marcha.

Métodos de aplicación: Con equipos tractorizados o mochilas usar boquillas de abanico plano logrando un tamaño de gota homogénea media a fina. Regular la máquina antes de aplicar haciendo una pequeña prueba con agua sola. Verificar que las boquillas estén en buen estado.
No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 500 mts de cualquier zona urbana o suburbana y centros poblados ni inferior a 30 mts de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). Ni inferior a 30 mts de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). Ni a menos de 500 mts del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales oleaginasas y forrajeros) a una distancia inferior a 300 mts de cualquier zona urbana o suburbana y centros poblados. No realizar aplicaciones terrestres con maquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 10 mts de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No realizar aplicaciones terrestres con maquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 mts de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No efectuar el llenado con agua de las maquinas de aplicación o directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales. El mismo deberá realizarse siempre utilizando recipientes intermedios". Ni inferior a 300 mts del límite del predio de centros educativos.

Dosis: Acelga, espinaca y remolacha……0,5 a 1,2 kg/há suelos limosos en suelos mas arcillosos de 1 a 2,5. Formulación: Suspensión concentrada

Tiempo de reingreso mínimo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

Firma registrante:

Fecha de Vencimiento: 30/12/2018

Contenido Neto: 500 grs.

SAUDU FUNDADA EN 1901 junto al productor

Avda. República de Corea 2962
Tel: 2508 6322* • 2508 8866 (10 Líneas Colectivas)
Fax: 2508 6322 int. 130 • saudu@saudu.com.uy
www.saudu.com.uy

Fabricante: XIAN WENYVAN CHEMICAL INDUSTRY COM

País de orígen: CHINA