# TRIAFOL 80 WDG

## FUNGICIDA

| Principio Activo | Porcentaje en peso |
|---|---|
| FLUTRIAFOL | 80 % |

**GRÁNULOS DISPENSABLES**

**GRUPO QUÍMICO: TRIAZOL**

**REGISTRO Nº 3814**

**Instrucciones de almacenamiento:** guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitandola luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia que diga "Cuidad-Veneno" (con símbolo de calavera).

**Clasificación Toxicológica:** Clase II(dos) MODERADAMENTE PELIGROSO, IPCS/OMS, 2009.

**Antídotos:** No tiene.

**Primeros Auxilios:**
En caso de ingestión no provocar el vómito.
En caso de contacto con la piel, lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
En caso de contacto con los ojos: lavado a chorro con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.
En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.

**Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:**
Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.
No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.
No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.
Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.
Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:
Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.
Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.
Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:
Producto poco tóxico para aves; ligeramente tóxico para peces y moderadamente tóxico para abejas.
Tomar la precaución de no aplicar directamente sobre las abejas o colmenas.
Disposición final de envases:
Perfore los envases vacíos para evitar la reutilización.

**"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".**
**"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELÉFONO (02) 1722".**
**"CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE".**
**"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".**
**"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".**
**Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.**
**"USO AGRÍCOLA".**
**"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO -si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO".**
**"PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA".**

**Generalidades e instrucciones para su uso: TRIAFOL 80 WDG**, es un fungicida sistémico del grupo de los triazoles, actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol. Posee control preventivo de diferentes enfermedades, en los cultivos mencionados a continuación:

| Cultivo | Enfermedad | | Dosis grs/ha |
|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Científico | |
| TRIGO | Roya anaranjada<br>Rolla de tallo | Puccinia recondita f. sp. tritici<br>Puccinia graminis f. sp.tritici | 160 a 235 |
| CEBADA | Roya enana<br>Escaldadura<br>Oídio | Puccinia hordei<br>Rhynchosporium secalis<br>Erysiphe graminis | |
| SOJA | Roya de la soja<br>Mancha marrón<br>Mancha ojo de rana | Phakopsora pachyrhizi<br>Septoris glycines<br>Cercospora sjina | 80 a 117 |

**Momento de aplicación:** aplicar en forma preventiva, cuando se den las condiciones climáticas favorables para el desarrollo de las enfermedades o a la aplicación de los primeros síntomas.
**Número o frecuencia de aplicaciones:** aplicar desde la aparición de síntomas, cada 10 a 15 días.
**Compatibilidad y fitotoxicidad:** compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. En caso de realizar mezclas, diluir los componentes de la misma por separado, agregándolos al tanque de la máquina con los agitadores en marcha.
En caso de duda, se debe efectuar una prueba previa a la aplicación, en pequeña escala para probar su compatibilidad con otro fitosanitario como asimismo su fito compatibilidad. Observar las recomendaciones se contradicen con las establecidas en esta etiqueta, no efectuar la mezcla.
**Tiempo de espera:** Trigo y Cebada: 21 días, Soja: 7 días
**Tiempo de reintegro al cultivo:** no ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado.
**Otras informaciones NECESARIAS respecto al uso:** cuando funguicidas de un mismo modo de acción, son usados repetidamente en las mismas zonas o sobre el mismo cultivo, puede producirse la aparición de biotipos resistentes, que logran sobrevivir, propagarse y/o volverse dominantes en dicha zona del cultivo. Alternar o combinar la aplicación de este producto con funguicidas de diferente modo de acción, puede evitar o demorar la aparición o el desarrollo de resistencia.
**Modo de preparación y técnica de aplicación:** llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad y luego con los agitadores en marcha agregar la cantidad necesaria de Triafol 80 WDG y completar el llenado con agua.
No efectuar el llenado con agua de las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse mediante recipientes intermedios.
Puede aplicarse con equipos terrestres o aéreos.
No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.
No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.
No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).
No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.
Prohíbense las aplicaciones aéreas de de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a distancia inferior a 500 metros del límite del predio de centros educativos.
Prohíbense las aplicaciones terrestres de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 300 metros del límite del predio de centros educativos.

FIRMA REGISTRANTE:
SAUDU junto al productor
SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY
Brigadier General Fructuoso Rivera (Ruta 5 km 175500) Nº 7451 esq. Altuna, Montevideo
Tels: 2508 6322 Fax: 2508 6322 int.130
E-mail: saudu@saudu.com.uy
Web: www.saudu.com.uy

**Nº LOTE:**
**FECHA DE VTO:**
**FECHA DE FAB:**
**NOMBRE DEL FABRICANTE: JIANGSU SEVENCONTINENT GREEN CHEMICAL LTD**
**PAIS DE ORIGEN: CHINA**