

**Clasificación Toxicológica:** Poco peligroso en su uso habitual (IPCS/OMS 2044). Clase III (tres).

**Antídotos:** No tiene

**Primeros auxilios:** En caso de ingestión NO provocar el vómito. En caso de contacto con la piel. Lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

En caso de contacto con los ojos: Lavado a chorro con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos.

En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.

**Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:**

Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.

No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva.

Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto

Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.

No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

No contaminar lagos, ríos u otras fuentes o corrientes de agua con restos de producto.

Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple Lavado" del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perforo el envase para evitar su reutilización.

**Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:**

Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico.

Toxicidad para aves: Poco no tóxico.

Toxicidad para peces: Ligeramente tóxico.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.**

**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELÉFONO (02) 1722.**

**CONCURRE AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.**

**NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**

**NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.**

**PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.**

**USO AGRÍCOLA.**

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –SI EXISTE-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

# RIVAL

**FUNGUCIDA**

| Principio Activo | Porcentaje en peso | Contenido en Volúmen |
|------------------|--------------------|----------------------|
| Clorotalonil     | 40 %               | 500 grs/lt           |

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA  
GRUPO QUÍMICO A QUE  
PERTENECE EL INGREDIENTE:  
CLORONITRIL**

**PRODUCTO AUTORIZADO POR  
EL MGAP  
REGISTRO N° 2282**

**Instrucciones de almacenamiento:** guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia que diga "Cuidado-Veneno"(con símbolo de calavera).



Número de lote:

Nombre del fabricante:

Contenido Neto:

País de origen:

Fecha de Vencimiento:

**Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:** Rival es un fungicida recomendado para el control de enfermedades en los cultivos mencionados a continuación.

| Cultivo   | Enfermedad         |                            | Dosis                              |
|-----------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|
|           | Nombre Común       | Nombre Científico          |                                    |
| Papa      | Tizón tardío       | Phytophthora infestans     | 1,5 a 2,5 lts/ha<br>2,5 a 3 lts/ha |
|           | Tizón temprano     | Alternaria solani          |                                    |
| Duraznero | Podredumbre morena | Monilia frutigena          | 250 a 350 cc/100 lts de agua       |
|           | Torque             | Taphrina seformans         |                                    |
|           | Mal del chumbo     | Coryneum carponhilum       |                                    |
| Tomate    | Tizón temprano     | Alternaria solani          | 300 a 250 cc/100 lts de agua       |
|           | Tizón tardío       | Phytophthora infestans     |                                    |
|           | Mancha gris        | Stemphylium solani         |                                    |
| Pimiento  | Tizón temprano     | Alternaria solani          | 300 a 350 cc/100 lts de agua       |
| Cebolla   | Mildiu             | Peronospora destructor     | 350 cc/100 lts de agua             |
| Melón     | Antracnosis        | Glomerella lagenarium      | 350 a 400 cc/100 lts de agua       |
| Sandia    |                    |                            |                                    |
| Zapallo   | Mildiu             | Pseudoperonospora cubensis | 350 a 400 cc/100 lts de agua       |
| Pepino    |                    |                            |                                    |

**Compatibilidad y fitotoxicidad:** Con la mayoría de los plaguicidas de uso común que sean de reacción ácida. No mezclar con productos de reacción alcalina. En caso de realizar mezclas, diluir los componentes de la misma por separado, agregándolos al tanque de la máquina con los agitadores en marcha.

**Modo de aplicación:** Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad y luego con los agitadores en marcha agregar la cantidad necesaria de Rival y completar el llenado con agua.

No efectuar el llenado con agua de las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse mediante recipientes intermedios.

**Método de aplicación:** Con equipos terrestres o aéreos

No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 500 mts de cualquier zona urbana o suburbana y centros poblados. Ni inferior a 30 mts de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares) ni a menos de 50 mts del límite del predio de escuelas rurales.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales oleaginosos y forrajeros) a una distancia inferior a 300 mts de cualquier zona urbana o suburbana y centros poblados. No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 10 mts de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. Ni inferior a 30 mts del límite del predio de escuelas rurales.

**Tiempo de espera:** Durazno: 15 días. Tomate y Pimiento: 5 días. Papa: 0 día. Cucurbitáceas: 1 día. Cebolla: 7 días.

**Tiempo de reingreso al cultivo:**

No ingresar al área tratada, hasta que la pulverización haya secado, dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

